



Informatie stereotactische biopsie

Bij een stereotactische biopsie worden er kleine stukjes weefsel uit uw borst gehaald voor nader onderzoek. Dit doen we met behulp van een mammografie-apparaat. Hieraan zit een computer gekoppeld die de juiste plaats van de afwijking berekent.

Vorbereiding op het onderzoek

Wanneer u bloedverduunners gebruikt, is het van belang dat u dit gebruik in overleg met uw arts aanpast om de kans op een nabloeding zoveel mogelijk te beperken. In principe kunt u andere medicijnen gewoon innemen.

Gebruik voor het onderzoek geen bodylotion, crème of talkpoeder op de borsten, want dit vermindert de kwaliteit van het onderzoek. Het is aan te raden om na het onderzoek een stevige bh te dragen. U hoeft niet nuchter te zijn. U mag uw medicijnen gewoon innemen.

Hoe verloopt het onderzoek?

- De afwijking in de borst wordt in beeld gebracht met het mammografie apparaat.
- U moet hiervoor zo comfortabel mogelijk op uw buik op een onderzoekstafel liggen.
- Het is erg belangrijk dat uw borst niet beweegt tijdens het onderzoek. Daarom ligt uw borst tijdens de hele procedure iets vastgeklemd tussen het apparaat.
- Met het apparaat wordt de precieze plaats van de afwijking berekend aan de hand van foto's die in verschillende richtingen worden genomen.
- Wanneer het plekje goed in beeld is gebracht, wordt de borst plaatselijk verdoofd.
- Nadat de verdoving goed is ingewerkt, wordt er een klein sneetje in de huid gemaakt, hierdoor wordt de naald ingebracht en op juiste plaats gepositioneerd.
- Door deze holle naald kan met een speciaal apparaat weefsel uit de borst worden gehaald.
- Er zijn minimaal zes stukjes weefsel nodig om voldoende informatie te verkrijgen.
- Na afloop wordt er een klein (6 mm) markertje ingebracht op de plek waar de biopten zijn genomen, dit is zichtbaar op mammografie, echografie en MRI. Als de uitslag goedaardig is kan deze marker in uw borst blijven zitten.
- Het weefsel wordt op de afdeling pathologie onderzocht.

U mag 24 uur na het onderzoek niet douchen, sporten en zwaar tillen. Dit vergroot de kans op een bloedingstorting. Om uw borst steun te geven na de biopsie raden we u aan om een stevige bh aan te doen als u voor dit onderzoek naar het ziekenhuis komt.



Complicaties

De kans op complicaties is gering. In enkele gevallen kunnen de volgende complicaties zich voordoen:

- Napijn : u kunt dan paracetamol 500 mg innemen (max. 6 tabletten per 24 uur).
- nabloeding: als het wondje erg bloedt of er vormt zich een mandarijn Grote zwelling neem dan contact op met onze afdeling op onderstaand nummer.
055-5818300 en na 17:00 de spoedeisende hulp via 055-5818181

Uitslag van het onderzoek

De aanvragend arts bespreekt de uitslag met u tijdens de volgende afspraak.

Begeleiding

Hoewel de radiologen en radiologisch laborante begrip hebben voor het feit dat uw eventuele begeleider/ster een grote steun voor u is bij een ziekenhuisbezoek, wordt hem/haar gevraagd de onderzoekkamer tijdens het onderzoek te verlaten en te wachten in de wachtkamer.

Het verrichten van een onderzoek vergt uiterste concentratie van de onderzoeker. Wij vragen uw begrip voor deze gang van zaken. In overleg met de laborant kan hiervan worden afgeweken.