



NOAC bij atriumfibrilleren

U bent gestart met een (ander) medicijn voor de antistolling:

- Eliquis (apixaban)*
- Xarelto (rivaroxaban)* Let op: gebruik hierbij geen grapefruitsap!
- Lixiana (edoxaban)*
- Pradaxa (dabigatran)* Met veel water in te nemen en vervolgens gedurende 30 minuten rechtop te blijven staan of zitten
(*Doorhalen wat niet van toepassing is)

Belangrijk

- Neem uw medicijnen in zoals voorgeschreven (1 of 2 keer per dag).
- Neemt u de medicijnen niet in? Dan bent u niet beschermd tegen de verhoogde kans op een beroerte!
- Vertel uw tandarts, chirurg of andere arts welke bloedverdunner u gebruikt voordat u een ingreep ondergaat.
- Gebruik geen medicatie die u zonder recept kunt kopen. Gebruik in ieder geval geen: Diclofenac, Ibuprofen, Naproxen, Aleve, Advil, Aspirine, APC, Arthrotec, Sint Jans-kruid of Chinese medicijnen.
- Paracetamol is wel toegestaan.
- Draagt altijd een lijst met uw medicijnen bij u.

Heeft u vragen?

Bel de polikliniek cardiologie op telefoonnummer (055) 581 1801 of stuur een e-mail naar AFpoli@gelre.nl

Spoed?: bel 112.

