

Darmvoorbereiding X- colon-inloop

bij kinderen van 9 jaar en ouder met chronische obstipatie/faecale impactie

Week voor het onderzoek

U ontvangt in mijnjelre.nl de datum en tijd van de afspraak voor dit onderzoek. De datum is reeds door de kinderarts (MDL) met u afgesproken.

Voor het tijdstip van nuchter zijn en tijdstip van melden op de dagbehandeling van de afdeling Kind & Jeugd, route 40, krijgt u via mijnjelre.nl een bericht. Dit moet u aan klikken voor onderstaande informatie. Bij eventuele vragen kunt u bellen met de afdelingssecretaresse, tel. 055 - 581 15 75.

Hier kunt u de tijden noteren voor de dag van de operatie:

Geen ontbijt, alleen helder vloeibaar.

- 4 uur tevoren 1 beker helder vloeibaar (ranja/thee met suiker/appelsap/dubbelfris), dus om uur.
- 2 uur tevoren helder vloeibaar (ranja/thee met suiker/appelsap/dubbelfris), dus om uur.
- 1 uur tevoren melden op de afdeling, dus om uur.

Huidige medicatie macrogol (poeder of zakje) ophogen naar 1 gram per kg lichaamsgewicht per dag, in 2 x per dag op vrijdag en zaterdag.

Dag -2: (zaterdag)

Voeding	Normaal ontbijt, lichte lunch, vervolgens alleen dik en dun vloeibaar
Medicatie	macrogol 1 gram/kg lichaamsgewicht in 2 x per dag, bvb 2 x per dag 20 gram
22.00 uur (net voor het slapen gaan)	bisacodyl 2 tabletten van 5 mg.

Dag -1: (zondag)

Voeding	Bakje yoghurt (zonder stukjes) of vla als ontbijt, erna alleen helder vloeibaar (geen maaltijden!)
Medicatie	Vandaag geen macrogol (Forlax/Movicolon)

9.00 uur	1 zakje natriumpicosulfaat/magnesiumcitraat poeder voor drank 16,1 g (Picoprep®) oplossen in 150 ml water en dit (laten) opdrinken
Hierna elk uur 200 tot 250 ml helder vloeibaar (bijv. water, thee, appelsap, ijsthee, aangengelgd limonadesiroop, heldere bouillon), tot volgende gift Picoprep®	
15.00 uur	1 zakje natriumpicosulfaat/magnesiumcitraat poeder voor drank 16,1 g (Picoprep®) oplossen in 150 ml water en dit laten opdrinken
Vervolgens elk uur 200 ml helder vloeibaar tot 22.00 uur	

Dag 0: (maandag/ dag van de scopie)	
Voeding	Helder vloeibaar tot nuchtertijd
Medicatie	Vandaag geen macrogol (Forlax® /Movicolon)
Na binnenkomst op DVP Kind & Jeugd	Rectaal spoelen via een slangetje met lauw warm water (25 ml/kg, max. 1000ml)
's Middags	Coloscopie (duur ca. 1 uur) +/- duodenoscopie (afhankelijk van indicatie)

Heeft u na het lezen van deze brochure vragen? Neem dan contact op met uw behandelend arts.