



# Koorts en keelpijn bij Thiamazol (Strumazol), Carbimazol of PTU

In overleg met uw internist gaat u één van de volgende medicijnen gebruiken: Thiamazol (Strumazol), Carbimazol of PTU (Propylthiouracil). Deze medicijnen worden als geneesmiddel gebruikt bij patiënten met een te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie). Deze folder is bedoeld voor patiënten die één van deze middelen gebruiken en geeft u advies wat u moet doen bij klachten van koorts, en zeker wanneer er ook sprake is van keelpijn, tijdens gebruik van deze medicijnen.

## Te snelle schildklier

Wanneer uw schildklier te snel werkt, heeft u een teveel aan schildklierhormoon in uw bloed. Daardoor kunnen diverse klachten ontstaan onder andere: vermoeidheid, gejaagdheid, bonkende/versnelde hartslag, kortademigheid, nervositeit, spierpijn, diarree en vermagering. Door het geven van medicijnen (thyreostatica) kan de werking van de schildklier geremd worden. De schildklier geeft dan minder schildklierhormoon af. Medicijnen met deze werking zijn: Thiamazol (Strumazol), Carbimazol en Propylthiouracil (PTU).

## Ernstige bijwerkingen

Net als veel andere geneesmiddelen kunnen ook deze medicijnen soms bijwerkingen geven. De meest ernstige bijwerking is een verstoring van de aanmaak van witte bloedcellen in het beenmerg. De witte bloedcellen zijn nodig voor de afweer tegen infecties. De belangrijkste verschijnselen zijn keelpijn en koorts (boven de 38,5°C). Deze bijwerking is zeldzaam (1 op de 1000 patiënten) en kan van de ene op de andere dag ontstaan. Regelmatig bloedonderzoek voor controle van de witte bloedcellen is daarom niet zinvol en moet alleen plaatsvinden wanneer u koorts heeft en wanneer er ook sprake is van keelpijn.

## Contact opnemen

Heeft u koorts (> 38,5°C) en keelpijn? Stop dan onmiddellijk het gebruik van uw medicijn en neem direct contact op met uw behandelend internist of huisarts, ook in het weekeinde. Hij/zij kan ervoor zorgen dat dezelfde dag uw bloed wordt onderzocht. Bij het stoppen van het geneesmiddel treedt vrijwel altijd volledig herstel op van de witte bloedlichaampjes. Uw medicatie zal worden herzien door uw internist.

Als het aantal witte bloedcellen normaal is, dan kunt u het gebruik van uw medicijn voortzetten.

Z.O.Z.



## Bereikbaarheid

Uw internist is tijdens kantooruren bereikbaar via:

- Polikliniek Interne Geneeskunde, Gelre Apeldoorn, tel: 055 – 581 81 63
- Polikliniek Interne Geneeskunde, Gelre Zutphen, tel: 0575 – 592 812
- Buiten kantooruren neemt u contact op met de huisartsenpost:
  - Apeldoorn: 0900 - 600 9000
  - Zutphen: 0900 – 200 9000