



Coloscopie bij kinderen 4 – 9 jaar

In overleg met de behandelend arts van uw kind wordt bij uw kind een coloscopie uitgevoerd. In deze brochure leest u wat u moet doen ter voorbereiding van dit onderzoek.

De scopie wordt in principe ingepland door kinderarts MDL op het kinderscopieprogramma, wat elke 2 weken op de maandagmiddag plaatsvindt.

Wat is een coloscopie?

Coloscopie is een onderzoek van de gehele dikke darm. Met een endoscoop wordt in de darm gekeken. Een endoscoop is een flexibele slang met een camera. De arts bekijkt met behulp van deze sloop de binnenkant van de darm.

Filmpje van het onderzoek

Bekijk een filmpje over het onderzoek op www.gelreziekenhuizen.nl/Darmonderzoek-bij-kinderen

Vorbereiding

Tijdens het onderzoek mogen er geen voedselresten in de dikke darm voorkomen. Deze voedselresten kunnen het zicht belemmeren. Zonder voedselresten kan de arts goed beoordelen of het dikke darmslijmvlies bij uw kind gezond of ziek is. Als tijdens het onderzoek onverhoopt blijkt dat de darm niet schoon is, bestaat de kans dat het onderzoek mislukt en opnieuw gedaan moet worden. Het is daarom uiterst belangrijk dat uw kind een goede voorbereiding krijgt om de darm schoon te maken.

Schoonmaken van de darmen

Het schoonmaken van de darm gebeurt door het drinken van een laxeerdrank en een minimale hoeveelheid helder drinken en op de dag van onderzoek het spoelen van de darm.

Wijze van oplossen Picoprep

1 zakje natriumpicosulfaat/magnesiumcitraat poeder voor drank 16,1 g (Picoprep®) oplossen in 150-200 ml koud water, 2-3 min roeren en dan opdrinken. Soms wordt de oplossing warm, dan wachten tot het afgekoeld is.



Hoe verloopt het onderzoek?

- Als uw zoon of dochter op de afdeling Kind & Jeugd komt, gaan we eerste alle gegevens noteren.
- Gaat uw kind met een infuus onder narcose? Dan krijgt hij/zij eerst op beide handruggen een verdovende zalf. Tenminste als uw kind dit wil.
- Gaat uw kind onder narcose met een kapje? Dan krijgt uw kind pas hierna een infuus. Een verdovende zalf is dan niet nodig. Dit gebeurt vooral bij kleine kinderen.
- Vervolgens gaat hij/zij met het bed naar de speciale onderzoekskamer op de afdeling Kind & Jeugd, waar het onderzoek plaatsvindt.
Uw kind krijgt hartslagplakkers op de borst geplakt.
Totdat uw kind onder narcose is mag één ouder aanwezig blijven. Daarna mag u wachten in de dagverplegingskamer. Deze ligt naast de onderzoekskamer. U bent dus vlakbij uw kind. En uw kind gaat niet de afdeling af.

Uitslag van het onderzoek

Voordat u met uw kind naar huis gaat, hoort u de voorlopige uitslag van het onderzoek en wordt verdere beleid uitgelegd. De afgenomen stukjes weefsel (biopten) worden onderzocht onder de microscoop in een laboratorium. De uitslag is na ongeveer 7 werkdagen bekend. Deze uitslag wordt telefonisch of tijdens een polikliniekbezoek met u besproken.

De scopie vindt plaats op

Dag -3: (vrijdag)	
Ouder moet tussen 14.00 uur en 15.00 uur bellen naar de afdeling Kind & Jeugd (055-5811575) voor:	
- scopietijd / aanwezigheid afdeling	
- nuchter beleid (helder vloeibaar tot 2 uur voor het scopie onderzoek)	

Dag -2: (zaterdag)	
Voeding:	Normaal ontbijt, normale lunch, lichte avondmaaltijd
+19.00 uur	1 bisacodyl 5 mg tablet



Dag -1: (zondag)	
Voeding:	Bakje yoghurt (zonder stukjes) of vla als ontbijt, erna alleen helder vloeibaar (geen maaltijden!)
9.00 uur	1 zakje natriumpicosulfaat/magnesiumcitraat poeder voor drank 16,1 g (Picoprep®) oplossen in 150 ml water en dit laten opdrinken
Hierna elk uur 150 tot 175 ml helder vloeibaar (bijv. water, thee, appelsap, ijsthee, aangengend limonadesiroop (geen rode), heldere bouillon), tot volgende gift Picoprep®	
15.00 uur	1 zakje natriumpicosulfaat/magnesiumcitraat poeder voor drank 16,1 g (Picoprep®) oplossen in 200 ml water en hiervan 100 ml (dus half zakje) laten opdrinken.
Vervolgens elk uur 150 tot 175 ml helder vloeibaar tot circa 20:00 uur	

Dag 0: (maandag/ dag van de scopie)	
Voeding:	Helder vloeibaar tot nuchtertijd
Na binnenkomst op DVP Kind & Jeugd	Rectaal spoelen via een slangetje met lauw warm water (25 ml/kg max. 1000ml)
's Middags	Coloscopie (duur ca. 1 uur) +/- duodenoscopie (afhankelijk van indicatie)

Heeft u na het lezen van deze brochure vragen? Neem dan contact op met uw behandelend arts.