



Mesalazine

Bij maag-darm-leverziekten

Uw behandelend arts en/of verpleegkundige heeft met u gesproken over het gebruik van Mesalazine. In deze folder krijgt u informatie over de werking en het gebruik van dit medicijn en hoe u moet handelen in geval van bijwerkingen. Deze folder is echter géén vervanging van de bijsluiter.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of verpleegkundige.

Algemeen

De oorzaak van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa is niet bekend. Elke behandeling met medicijnen is gericht op het onderdrukken van ontstekingsreacties. Dit leidt tot vermindering van klachten en verkleint de kans op complicaties die zich bij deze ziekte voor kunnen doen. Medicijnen kunnen de darmontsteking onderdrukken maar de huidige medicijnen kunnen de ziekte niet definitief genezen. Na het afbouwen van of stoppen met medicijnen kunnen de klachten weer terugkomen.

Werking

Mesalazine wordt gebruikt bij ontstekingen van de dunne- en dikke darm. Nadat Mesalazine is ingenomen komt het via de maag in de darm terecht. De werkzame stof komt vrij in de dunne darm. De werking treedt geleidelijk in. Mesalazine wordt niet alleen gebruikt om een ontsteking tot rust te brengen maar ook om nieuwe ontstekingen te voorkomen. Mesalazine is bekend onder de volgende merknamen: Asacol®, Claversal®, Dipentum®, Mezavant®, Pentasa®, Salofalk®.

Gebruik

Mesalazine is verkrijgbaar in tabletten van 250 of 500 mg en is ook als zetpil, klysma en granulaat verkrijgbaar. De meest gebruikelijke dosis is 3 x 2 tabletten van 500 mg per dag of wordt 1 tot 2 keer daags in hogere dosering gegeven. Uw behandelend arts kan in bepaalde omstandigheden een hogere of lagere dosis voorschrijven.

Wanneer innemen?

Om bijverschijnselen zo veel mogelijk te beperken, kunt u de tabletten het beste tijdens de maaltijd innemen. Slik de tabletten met water in hun geheel door. Granulaat kunt u met een lepel met vla, yoghurt of kwark innemen.

Bijwerkingen

Mesalazine heeft meestal weinig bijwerkingen. Heeft u echter last van (mogelijke) bijwerkingen, raadpleeg dan altijd uw behandelend arts, MDL- verpleegkundige of verpleegkundig specialist MDL.



De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

- huiduitslag, jeuk
- misselijkheid
- diarree
- haaruitval
- duizeligheid, hoofdpijn
- stemmingsveranderingen
- nierfunctiestoornis (zeldzaam)

U merkt zelf niets bij een nierfunctiestoornis. Daarom zal uw arts uw bloed regelmatig controleren.

Zwangerschap, vruchtbaarheid en borstvoeding

Mesalazine is niet van invloed op de vruchtbaarheid van zowel man als vrouw.

Mesalazine kan tijdens de zwangerschap en periode van borstvoeding veilig worden gebruikt. Overleg wel altijd met uw behandelend arts als u een zwangerschap overweegt of borstvoeding geeft/wil geven.

Wanneer contact opnemen?

Heeft u nog vragen of krijgt u last van bovengenoemde bijwerkingen?

Neem dan contact op met uw behandelend arts, MDL-verpleegkundige of verpleegkundig specialist MDL.

Polikliniek MDL

- maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur
- Tel: 055 – 581 80 30

Telefonisch spreekuur MDL-verpleegkundige

- maandag t/m vrijdag 10.30 – 11.30 uur
- Te bereiken via telefoonnummer polikliniek MDL.