



# Endoscopische Full Thickness Resectie


Uw arts heeft voorgesteld om een Endoscopische Full Thickness Resectie (eFTR) bij u te doen. Er wordt dan een afwijking (laesie) in de darmwand verwijderd. In deze folder leest u wat de behandeling inhoudt. Ook wordt beschreven wat u tijdens en na de behandeling kunt verwachten.

## Opname

Voorafgaand aan de behandeling krijgt u op de verpleegafdeling een infuus met antibiotica. Dit is nodig om de kans op infecties na de behandeling zo klein mogelijk te maken. Na de ingreep blijft u ook nog een nacht ter observatie in het ziekenhuis. Houdt U rekening met de afspraken. U krijgt een afspraak voor de opname op de verpleegafdeling en een afspraak voor het onderzoek zelf

## De procedure

De arts zoekt eerst met een endoscoop de afwijking (laesie) op. Wanneer de laesie gevonden is, wordt deze omhoog gehaald via een paktang. Vervolgens brengt de arts een klem aan onder de laesie, waarna deze boven de klem wordt afgesneden. De klem zorgt ervoor dat het wondje in de darm direct gesloten is.



## De uitslag

Na afloop van de behandeling wordt u naar de nazorg gebracht. Als u bent bijgekomen, komt de arts of physician assistent (PA) kijken hoe het met u gaat en hoe de behandeling is verlopen. Bij een volgend consult wordt u uitgebreider ingelicht over de bevindingen van de verwijderde laesie.

## Complicaties

- Perforatie: De eFTR-behandeling geeft een klein risico op een gaatje in de darmwand.



- Bloeding: Tijdens of na de eFTR-behandeling kan er bloedverlies ontstaan uit het wondvlak. Deze bloeding stopt meestal vanzelf. Soms is een opname of een aanvullende behandeling nodig.

## Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder vragen? Neem dan contact op met de arts die deze behandeling met u heeft afgesproken. Of kijk op [www.gelreziekenhuizen.nl](http://www.gelreziekenhuizen.nl)