



Pleurapunctie / pleuradrainage

In overleg met uw arts heeft u besloten een pleurapunctie of pleuradrainage te laten uitvoeren. In deze folder vindt u informatie over dit onderzoek.

Pleurapunctie

Een pleurapunctie of pleuradrainage is een onderzoek waarmee de arts nagaat of er vocht tussen de longvliezen zit. Als er vocht zit, wordt dit afgezogen en onderzocht. Ook kan een vochtophoping die benauwdheid veroorzaakt, worden weggezogen.

Vorbereiding

Voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn, u mag dus gewoon eten en drinken. Er worden verder geen speciale voorbereidingen getroffen. Meestal krijgt u geen verdoving omdat de prik voor verdoving hetzelfde voelt als de prik voor het afzuigen van het vocht. Bij een pleuradrainage (prik met dikkere naald) krijgt u wel een plaatselijke verdoving. Gebruikt u bloedverdünnende middelen zoals sintrom mitis, marcoumar of een ander middel? Bespreek dan met uw arts vooraf of u tijdelijk met deze middelen moet stoppen.

Het onderzoek

U trekt uw bovenkleding uit en gaat op de rand van het bed zitten. De arts staat meestal aan uw rugzijde. Hij/zij brengt een naald langs de bovenkant van een rib in, tot in de holte tussen de twee longvliezen. Op de naald zit een spuit waarmee het vocht wordt opgezogen. Dit vocht wordt opgestuurd voor onderzoek. Er wordt een pleister op het wondje geplakt.

Het onderzoek duurt ongeveer 5 - 10 minuten, soms iets langer als langzaam veel vocht wordt weggezogen bij een ontlastende punctie.

Na het onderzoek

De verpleegkundige controleert het wondje. De pleister mag u na 48 uur verwijderen. U hoeft niet in bed te blijven, maar doe het eerste uur na de pleurapunctie wel rustig aan. De uitslag van het onderzoek krijgt u na enkele dagen.

Complicaties

Moet u na het onderzoek bloed ophoesten of krijgt u het benauwd? Waarschuw dan meteen een verpleegkundige.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de pleurapunctie? Stel ze dan gerust aan de verpleegkundige of uw behandelend arts via de polikliniek Longgeneeskunde, tel: 0575 – 592 810.