



Aanvullende informatie echo-punctie buik

Binnenkort komt u op de afdeling Radiologie voor een punctie of bioptie. Het doel hiervan is dat er met een naald bij u een stukje weefsel (bioptie), een aantal weefselcellen of wat vocht (punctie) wordt weggenomen, zodat dit later in een laboratorium microscopisch kan worden onderzocht.

Hoe verloopt het onderzoek?

- De huid wordt gedesinfecteerd en u krijgt zonodig een plaatselijke verdoving (lidocaïne).
- Daarna wordt er, bij een bioptie, een sneetje van enkele millimeters in uw huid gemaakt waar de naald doorheen past. Bij een punctie is zo'n sneetje doorgaans niet nodig.
- Het aanprikken wordt door een radioloog en een laborant onder echogeleide gedaan, omdat zo met behulp van de echobeelden nauwkeurig de plaats kan worden bepaald waar gepuncteerd of gebiopteerd moet worden.
- Om er zeker van te zijn dat er voldoende vocht of weefsel wordt verzameld, kan het zijn dat er meerdere keren moet worden geprikt.
- Tijdens het onderzoek houden de radioloog en laborant u op de hoogte van wat er gebeurt.
- Bij sommige puncties is het, in verband met nazorg, nodig dat u één of meerdere dagen opgenomen wordt op een verpleegafdeling. Als dat bij u het geval is, dan heeft de behandelend arts dit met u besproken.

Vorbereiding op het onderzoek

Als voorbereiding op het onderzoek is het belangrijk dat u nuchter bent. Daarom mag u vanaf 24.00 uur (middernacht) voor het onderzoek niet meer eten, drinken of roken. Als u bloedverduuners gebruikt, dan is het van belang dat u dit gebruik in overleg met uw arts aanpast. Zo willen we de kans op een nabloeding zoveel mogelijk beperken. In principe kunt u andere medicijnen wel gewoon innemen

Complicaties

De kans op complicaties is gering. In enkele gevallen kunnen de volgende complicaties zich voordoen:

- napijn
- nabloeding/blauwe plek/lage bloeddruk
- bloed in de urine (na nierbioptie)
- klaplong (na punctie of bioptie in (de buurt van) de longen)
- buikvliesirritatie door galuittreding (na leverbioptie)



Bij pijnklachten kunt u (als u bent opgenomen in het ziekenhuis) de verpleegkundige om pijnstillers vragen. Thuis kunt u bijvoorbeeld paracetamol 500 mg (max. 6 tabletten per 24 uur) innemen.

Begeleiding

Indien mogelijk verzoeken we u om alleen naar de afdeling te komen. Gedurende de opname is het niet gebruikelijk dat er bezoek mee komt, de opname is immers kort. Afhankelijk van de opname of situatie, wordt i.o.m. de Verpleegkundige, hiervoor een uitzondering gemaakt.

Nazorg

- Bij een nierbiopsie is het nodig dat u 24 uur bedrust houdt. Hiervoor wordt u opgenomen op een verpleegafdeling. Het is goed om extra te drinken.
- Bij een leverbiopsie, via de rechter zij, blijft u twee uur op de rechter zij liggen en houdt u daarna nog twee uur bedrust. Hiervoor is een dagopname noodzakelijk.
- Gedurende 1 week mag u geen zware inspanning/ geen drukverhogende momenten opwekken zoals zwaar tillen en persen, geen contactsporten, e.d.
- De pleister mag u na 1 dag verwijderen.
- Vanaf de volgende dag mag u weer douchen .
- Bij vragen en/of klachten kunt u bellen met Gelre Ziekenhuizen T: 055-5818181. Tijdens kantoor tijden kunt u vragen naar de polikliniek Interne Geneeskunde. Buiten kantoor tijden en/of weekend kunt u vragen naar de Spoedeisende Hulp.

Uitslag van het onderzoek

De afdeling Radiologie zorgt dat de uitslag van het onderzoek naar uw behandelend arts gestuurd wordt. U spreekt met uw specialist af wanneer hij/zij de uitslag met u zal bespreken.