



Korte ACTH stimulatie test

In overleg met uw arts wordt bij u een korte ACTH stimulatie test uitgevoerd. Deze folder geeft informatie over de wijze waarop deze test verloopt en wat er van u wordt verwacht.

Doel onderzoek

De korte ACTH stimulatie test wordt gebruikt om de werking van de bijnierschors te onderzoeken.

Vorbereidingen

Voor dit onderzoek maakt u een afspraak bij de polikliniek van de internisten. Dit onderzoek kan plaats vinden op maandag t/m vrijdag en wordt verricht op de polikliniek Interne Geneeskunde van Gelre ziekenhuizen Apeldoorn.

Het onderzoek

De korte ACTH stimulatie test verloopt als volgt.

- Eerst wordt een buisje bloed bij u afgenomen.
- Na het plaatsen van een infuusnaald wordt synacthen door een arts in een bloedvat gespoten. Synacthen heeft een stimulerend effect op de bijnieren en het resultaat hiervan kan in het bloed onderzocht worden.
- Na 30 èn 60 minuten wordt nogmaals bloed bij u afgenomen.
- U hoeft niet nuchter te zijn.

In totaal krijgt u één injectie en wordt er drie keer bloed bij u afgenomen.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur en 15 minuten. Gedurende het onderzoek blijft u op de polikliniek wachten. Omdat u vrij lang stil moet zitten, is het wellicht prettig om iets te lezen mee te nemen.

Bijwerkingen

Na de injectie kunnen minimale bijwerkingen optreden, zoals:

- huidreacties rondom de injectieplaats
- duizeligheid
- misselijkheid

Ook kan de injectie uw rijvaardigheid beïnvloeden, houdt u hier rekening mee!

U mag daarom niet zelf naar huis rijden; zorg dat iemand u komt ophalen.



De korte ACTH stimulatie test mag **niet** worden uitgevoerd wanneer:

- u zwanger bent
- u borstvoeding geeft

Uitslag onderzoek

De uitslag van het onderzoek wordt met u besproken op de eerstvolgende afspraak met uw arts.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Interne Geneeskunde:

- maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur
- tel: 055 - 581 81 63

