



Implantatie PD katheter

In overleg met uw behandelend arts heeft u gekozen voor peritoneaal dialyse. Dit kan op twee manieren: CAPD (Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse) en APD (Automatische Peritoneaal Dialyse). Dit betekent dat er een speciale katheter geplaatst moet worden in uw buikholte.

In deze folder vindt u informatie over de operatie, eventuele klachten na de operatie en wat u kunt verwachten na implantatie van de katheter.

De katheter implantatie

Voor de operatie

U krijgt 2 recepten ongeveer anderhalve week van te voren opgestuurd: Eén voor Bactroban neuszalf. Hiermee start u twee dagen voor de operatie. Deze zalf doodt de huidbacterie die bij veel mensen in de neus aanwezig is. Het is gebleken dat bij gebruik van deze zalf op de dagen rondom de operatie er minder ontstekingen van de huidpoort optreden. Deze zalf moet u in totaal 5 dagen gebruiken.

Het andere recept is Movicolon. Dit medicijn voorkomt dat uw darmen te vol raken met ontlasting. Ook tijdens de PD behandeling zult u dit medicijn blijven gebruiken, zodat de PD katheter niet belemmerd wordt in de afvoer van de PD vloeistof door te volle darmen.

Een dag voor de operatie komt u bij de dialyseverpleegkundige. Hij/zij bepaalt samen met u de plaats van de katheter. Hierbij wordt rekening gehouden of u links- of rechtshandig bent en waar de tailleband van uw broek of rok zit. Als deze plaats is bepaald, zet de verpleegkundige hier een stip.

De operatie

De chirurg brengt de katheter in de buikholte onder algehele narcose. U houdt een klein sneetje onder de navel over aan de operatie. Het uiteinde van de katheter moet in de laagste punt van de buikholte liggen. Dit wordt de holte van Douglas genoemd. De duur van de operatie is 30 tot 45 minuten. Daarna wordt u naar de uitslaapkamer gebracht.

Na de operatie

Na de operatie komt een dialyseverpleegkundige langs om het verband te controleren. De eerste weken na de implantatie van de katheter heeft de buik rust nodig. De katheter is met twee cuffs in de buik vastgezet en heeft tijd nodig om vast te groeien. De onderhuidse tunnel en de katheterpoort zijn vaak gevoelig, de huid moet als het ware wennen aan de katheter. Het is van belang dat de katheter in dezelfde positie en steriel afgeplakt blijft. Daarom gebeurt de verzorging van de huidpoort de eerste 4 weken door een dialyseverpleegkundige. Deze verzorging bestaat uit het 1x per week steriel verwisselen van gazen en/of pleisters. U mag gedurende 4 weken niet douchen, omdat dit de kans op ontsteking verhoogt.



Klachten die u na de operatie kunt krijgen

Schouderpijn

Tijdens de operatie wordt uw buik gevuld met een hoeveelheid koolzuurgas (CO₂). Dit is nodig om de chirurg ruimte te geven om goed in de buik te kunnen kijken en werken. Vaak blijft er wat gas in de buik achter, dit kan geen kwaad. Wel kan dit gas pijn in de schouders geven doordat het uw middenrif prikkelt. Wanneer u hier last van heeft, kunt u de verpleging vragen om pijnmedicatie. Normaal gesproken is het gas, en daarmee de pijn binnen enkele dagen verdwenen.

Opgeblazen gevoel

Een opgeblazen gevoel is gedeeltelijk een gevolg van het koolzuurgas dat in uw buik is achter gebleven. Daarnaast moeten uw darmen na de operatie weer op gang komen. Dit gaat vaak gepaard met een opgeblazen gevoel en winderigheid.

Prikkeling rond blaas en anus

Het einde van de katheter ligt onderin de buikholte welk is bekleed met buikvlies. In dit buikvlies lopen bloedvaten en zenuwen. Wanneer de katheter het buikvlies raakt veroorzaakt dit prikkeling. Dit straalt vaak uit naar blaas en of anus en wordt over het algemeen als vervelend ervaren. Als u hiervan veel klachten ervaart kunt u in overleg met de dialyseverpleegkundige paracetamol gebruiken. De prikkeling neemt in de loop van de tijd af.

Het ontslag

Bij ontslag krijgt u een aantal afspraken mee voor de wekelijkse verbandwissel van de huidpoort en de datum waarop u start met de PD training. De periode tussen katheterimplantatie en PD training is meestal 14 dagen.

In deze periode is het belangrijk dat de ingebrachte katheter goed vastgroeit in de buikwand. Uw buik heeft daarom rust nodig. Dat wil zeggen dat u zo veel mogelijk moet vermijden dat er druk op de buikwand komt te staan:

- Til geen zware voorwerpen.
- Doe geen buikspieroefeningen.
- Ondersteun uw buik wanneer u moet niezen of hoesten.
- Draag geen knellende kleding.

Wanneer contact opnemen?

Bij de volgende klachten moet u contact opnemen:

- koorts (vanaf 37,5 °C)
- flink nabloeden
- obstipatie



Bereikbaarheid

Het Dialyse Centrum Apeldoorn bevindt zich op de 7e verdieping, route 118. De afdeling is telefonisch te bereiken op nummer: 055 - 5818810. Bij voorkeur beantwoorden wij uw vragen tijdens kantooruren, voor urgente zaken zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op dit telefoonnummer.

Patiënteninformatie wordt met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie.

U kunt aan deze uitgave geen rechten ontleen.

© Gelre ziekenhuizen
www.gelreziekenhuizen.nl