



Contrastallergie

Reactie op via de bloedbaan toegediend contrastmiddel

U heeft net een onderzoek gehad waarbij u contrastmiddel ingespoten heeft gekregen. Sommige mensen kunnen contrastvloeistof minder goed verdragen en dit uit zich in bijvoorbeeld galbulten of zwelling van de luchtwegen, bulten, jeuk of benauwdheid.

Dit was bij u het geval en dit wordt een **contrastallergie** genoemd.

De radioloog heeft u om de klachten te verminderen via het infuus medicijnen toegediend.

Wat moet er nu gebeuren?

Door de toegediende medicijnen is de allergische reactie tegen gegaan en kon u na verloop van tijd naar huis.

Let op: De kans dat uw lichaam bij een volgende keer wéér zo reageert is wat groter, vandaar dat u in het vervolg **altijd** medicijnen moet krijgen als u een onderzoek met contrastvloeistof moet ondergaan.

De specialist waar u onder behandeling bent geeft u daar dan een recept voor.

Deze medicatie heeft invloed op de rijvaardigheid! U mag dus niet zelf naar huis rijden!

Wat moet ik doen als de klachten veranderen/verergeren?

Blijkt thuis dat de klachten veranderen of verergeren dan kunt u ons bellen.

Afdeling Radiologie is bereikbaar:

- Maandag t/m vrijdag van 8:00-17:00 uur:
 - **Apeldoorn:** 055 – 844 6195
 - **Zutphen:** 0575 – 592 525
- Buiten kantooruren, beide locaties : 055 – 844 6194