



Besnijdenis circumcisie chirurgie

Deze folder geeft u informatie over de besnijdenis (circumcisie). Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

De reden voor de ingreep

Bij een vernauwing van de voorhuid van de penis (phimosis) kan de voorhuid niet meer over de eikel worden teruggeschoven. Dit kan een medische reden zijn om tot een besnijdenis (circumcisie) te besluiten. Om geloofsredenen kan vooral bij kinderen ook tot een besnijdenis worden besloten.

De operatie

De ingreep wordt doorgaans in dagbehandeling uitgevoerd meestal onder plaatselijke verdoving. Er worden dan twee injecties aan de basis van de penis gegeven. De gehele penis is daarmee tijdens de ingreep verdoofd. Bij kinderen wordt de ingreep onder algehele anesthesie (narcose) uitgevoerd. Bij een besnijdenis wordt de voorhuid een stuk ingekort. Gebeurt dat met een chirurgische ingreep dan wordt - na het losmaken en verwijderen van de voorhuid - het restant met oplosbare hechtingen vastgemaakt aan de rand van de eikel. Tegenwoordig wordt ook wel gebruik gemaakt van een soort ronde klem, die over de penis heen kan worden geschoven en op de voorhuid wordt geplaatst. De voorhuid wordt op die manier langzaam 'afgeklemd'. Het plaatsen van deze klem gebeurt ook onder een plaatselijke verdoving. Na de besnijdenis komt de eikel geheel bloot te liggen. Wanneer dat als behandeling wegens een vernauwing van de voorhuid (phimosis) niet de wens van de patiënt is, kan de arts een voorhuidplastiek doen, waarbij de voorhuid wijder wordt gemaakt. Een besnijdenis duurt ongeveer een half uur. Na één tot twee uur raakt de verdoving uitgewerkt en komt het gevoel in de penis weer terug.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico's. Zo is ook bij deze operatie de normale kans op complicaties aanwezig, zoals nabloeding of wondinfectie. Gelukkig komen deze weinig voor.

Na de operatie

- Als de verdoving uitgewerkt is, kunnen er wat pijnklachten zijn. Hiervoor kunt u pijnstillers als paracetamol gebruiken. Deze zijn te koop bij apotheek en drogist en het is raadzaam om deze voor de ingreep al vast in huis te hebben.
- Het plassen kan de eerste paar keer een branderig gevoel geven. Dit verdwijnt bij doorplassen.
- Het is verstandig om het op de dag van de ingreep wat rustig aan te doen.



Controle afspraak

Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor de poliklinische controle.

Adviezen voor thuis

Kort na de ingreep kan de penis er gezwollen en blauwrood uitzien. Dit verdwijnt in de loop van de week. Het korter zijn van de voorhuid heeft geen invloed op de seksuele beleving. Als de wond genezen is, is geslachtsgemeenschap weer mogelijk.

Vragen

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts of huisarts. Wanneer zich thuis na de operatie problemen voordoen, neem dan contact op met uw huisarts of met de polikliniek chirurgie. De polikliniek chirurgie is bereikbaar:

Gelre ziekenhuizen Apeldoorn

- maandag t/m vrijdag 8.30 - 16.30 uur
- tel: 055 - 581 81 20

Gelre ziekenhuizen Zutphen

- maandag t/m vrijdag 8.30 - 16.30 uur
- tel: 0575 - 592 818