



Spirometrie medicatie

In overleg met uw behandelend arts bent u verwezen voor een longfunctieonderzoek. Hierbij wordt het functioneren van uw longen onderzocht zowel voor als na inhalatie van luchtwegverwijdende medicatie. Deze folder geeft informatie over hoe dit onderzoek verloopt en wat van u verwacht wordt.

Vorbereiding

- In verband met het onderzoek moet u **stoppen** met het gebruiken van uw **longmedicatie**, zie schema 'Stoppen met medicatie'. Overige medicatie kunt u blijven gebruiken.
- Indien u behalve dit onderzoek ook een **Histamineprovocatietest** heeft, kunnen daar **alternatieve stakingstijden** zijn voor de medicatie. Zie hiervoor het schema 'Stoppen met medicatie' bijgevoegd bij de folder voor de Histamineprovocatietest.
- Het is verstandig om vanaf één uur voor het onderzoek geen zware inspanning te verrichten en tien minuten voor aanvang aanwezig te zijn, zodat u rustig en ontspannen aan het onderzoek kan beginnen.
- U mag vanaf één uur voor het afgesproken tijdstip **niet roken en/of vaperen**.
- U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek.

Het onderzoek

- Voorafgaand aan het onderzoek worden uw lengte en gewicht gemeten.
- U neemt plaats op een stoel.
- Hierna krijgt u een mondstuk in uw mond en een klemmetje op uw neus. Via het mondstuk kunt u normaal verder ademen.
- Vervolgens voert u een aantal ademhalingstesten uit.
- U krijgt luchtwegverwijdende medicatie. Na 15-30 minuten inwerktijd zal het bovenstaande onderzoek herhaald worden.

Het gehele onderzoek is pijnloos en duurt 45 minuten.



Uitslag van het onderzoek

De uitslag van dit onderzoek krijgt u van uw behandelend arts in het ziekenhuis.

Verhinderd?

Bent u verhinderd? Bel dan minimaal 24 uur vóór uw afspraak naar het ziekenhuis om dit door te geven. In uw plaats helpen we graag een andere patiënt.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel ze dan gerust aan de medewerkers van de polikliniek Longgeneeskunde.

Bereikbaarheid

Polikliniek Longgeneeskunde

ma t/m vrij 8.30 – 16.30 uur

Tel: 088 – 105 33 73

Aanmelden voor het onderzoek

Gelre Apeldoorn

Route 158

Gelre Zutphen

Route 21

Voor meer informatie

www.gelreziekenhuizen.nl/biometrie



Stoppen met medicatie voor spirometrie

6 uur van te voren

<i>(merknaam)</i>	<i>(stofnaam)</i>
Airomir	Salbutamol
Bricanyl	Terbutaline
Ventolin	Salbutamol

12 uur van te voren

<i>(merknaam)</i>	<i>(stofnaam)</i>
Atrovent	Ipratropium
Berodual	Fenoterol / Ipratropium
Combivent	Salbutamol / Ipratropium

36 uur van te voren

<i>(merknaam)</i>	<i>(stofnaam)</i>
AirFluSal Forspiro	Salmeterol / Fluticason
Atimos	Formoterol
Bufoleer Eashaler	Formoterol / Budesonide
Busalair	Salmeterol / Budesonide
DuoResp Spiromax	Formoterol / Budesonide
Elpenhaler	Salbutamol / Fluticason
Flutiform	Formoterol / Fluticason
Foradil	Formoterol
Foster	Formoterol / Beclometason
Oxis	Formoterol
Seretide	Salmeterol / Fluticason
Serevent	Salmeterol
Singulair	Montelukast
Symbicort	Formoterol / Budesonide

Patiënteninformatie wordt met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie.

U kunt aan deze uitgave geen rechten ontlenen.

© Gelre ziekenhuizen
www.gelreziekenhuizen.nl



48 uur van te voren

<i>(merknaam)</i>	<i>(stofnaam)</i>
Anoro	Umeclidinium / Vilanterol
Atectura Breezhaler	Mometason / Indacaterol
Bevespi	Glycopyrronium / Formoterol
Daxas	Roflumilast, actieve metaboliet
Duaklir Genuair	Aclidinium / Formoterol
Eklira Genuair	Aclidinium
Energair Breezhaler	Indacaterol / Glycopyrronium / Mometason
Incruse	Umeclidinium
Onbrez Breezhaler	Indacaterol
Relvar	Fluticason / Vilanterol
Seebri Breezhaler	Glycopyrronium
Spioflo	Tiotropium / Olodaterol
Spiriva	Tiotropium
Striverdi	Olodaterol
Theolair Retard	Theofylline
Tiotrus	Tiotropium
Trimbow	Beclometason / Formoterol / Glycopyrronium
Trelegy Ellipta	Fluticason / Vilanterol / Umeclidinium
Ultibro Breezhaler	Indacaterol / Glycopyrronium
Xoterna	Indacaterol / Glycopyrronium

Het is **niet** nodig met de volgende medicatie te stoppen:

<i>(merknaam)</i>	<i>(stofnaam)</i>
Qvar	Beclometason
Flixotide	Fluticasonpropionaat
Pulmicort	Budesonide
Alvesco	Ciclesonide

Indien het stoppen van uw luchtwegmedicatie niet mogelijk is, meldt u dan bij aanvang van het onderzoek welke medicijnen u wel gebruikt heeft.