



Cysten

Een cyste is een met vocht gevulde, afgekapselde holte, in bot of daarbuiten, te vergelijken met een ballon met vocht. De ballon is de cystewand, die het vocht produceert. Een cyste veroorzaakt meestal een zwelling, die op zichzelf niet pijnlijk is.

Hoe ontstaat een cyste ?

De oorzaak voor het ontstaan van een dergelijke holte is vaak een ontsteking, bijvoorbeeld van een tand of kies. Ook kan een cyste het gevolg zijn van een ophoping van speeksel, dit doet zich nogal eens voor in de onderlip. Soms is de oorzaak van cystevorming niet duidelijk.

Hoe wordt de diagnose gesteld ?

Een cyste kan op diverse plaatsen ontstaan. Als de cyste het gevolg is van een ontsteking van een tand of kies, kan deze op een röntgenfoto zichtbaar worden gemaakt. Een speekselcyste van de onderlip kan met het blote oog worden waargenomen, de diagnose is meestal eenvoudig voor een Mondziekten, Kaak- en Aangezichts MKA-chirurg te stellen.

Wat is de behandeling?

Wanneer een cyste niet weggenomen wordt, zal deze groter worden. Een cyste moet daarom in principe operatief worden verwijderd met zo mogelijk gelijktijdige behandeling van de oorzaak van de cyste. Een enkele maal doet zich na verwijdering van een cyste weer nieuwe cystevorming voor.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Kaakchirurgie in de locatie waar u behandeld wordt.

Gelre ziekenhuizen Apeldoorn

- maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.00 uur, tel 055 - 581 18 06
- polikaakchirurgieapeldoorn@gelre.nl
- buiten kantooruren via receptie/ Spoedeisende Hulp, tel: 055 – 581 81 81

Gelre ziekenhuizen Zutphen

- maandag t/m vrijdag 8.30 - 16.30 uur, tel 0575 - 59 28 22
- polikaakchirurgiezutphen@gelre.nl
- buiten kantooruren via receptie/ Spoedeisende Hulp, tel: 0575 – 592 592

*Deze informatie is afkomstig van Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichts chirurgie, de wetenschappelijke vereniging van kaakchirurgen in Nederland
Zie: www.kaakchirurg.nl*