



Greenstick fractuur van de pols bij kinderen

Bij uw kind is een greenstick fractuur (twijgbreuk) van de pols geconstateerd. De verdere behandeling van dit letsel gebeurt vanaf nu door de gipsverbandmeester. Hij/ zij behandelt volgens afspraken met de specialist. Bij onduidelijkheden of problemen in de behandeling overlegt de gipsverbandmeester altijd met de specialist.

De pols en de twijgbreuk

De pols is het gewricht dat wordt gevormd door de handwortelbeentjes en de twee onderarmbotten; het spaakbeen en de ellepijp. Het bot van kinderen is veel elastischer dan het bot van een volwassene en is omgeven door het beenvlies, dat bij kinderen taai en dik is. Kinderbot is te vergelijken met een jonge boomtak (twijg). Bij een twijgbreuk is het bot gebroken maar het beenvlies houdt het bot op zijn plek. Er ontstaat een soort 'knik' in het bot. Door het taaie beenvlies buigt het bot weer terug.

De behandeling

De behandeling bestaat vanaf nu uit maximaal twee weken onderarm gips. Na maximaal twee weken komt u terug op de gipskamer. Dan wordt het gips verwijderd. Als er geen pijn is, is verdere behandeling en een röntgenfoto niet meer noodzakelijk.

Leefregels met en zonder gips

- Tijdens het dragen van het gips tot en met twee weken na het verwijderen van het gips mag uw kind niet sporten. In deze periode mag uw kind ook niet op een trampoline of skateboarden.
- Het dragen van mitella/ sling is alleen noodzakelijk wanneer de vingers dikker dan normaal zijn.
- Het gipsverband mag absoluut niet nat worden, tenzij u zwemgips hebt gekregen, water kan jeuk en reuk laten toenemen. Ook kan de huid door vocht eerder kapot gaan. Bescherm het gips tijdens douchen daarom met een plastic zak of u kunt bij een thuiszorgwinkel een speciale douchehoes aanschaffen.

Vragen?

Heeft u nog vragen, bent u ongerust of zijn er problemen? Bel dan met de gipskamer:

- maandag t/m vrijdag 08.30 - 13.00 uur
- Tel: 0575 - 592 946
- 's avonds en in het weekend belt u met de Spoedeisende Hulp: 0575 - 592 356