



Slokdarm-maag onderzoek

Vorbereiding

U bereidt zich thuis voor op het onderzoek door nuchter te zijn. Dit betekent dat u vanaf 6 uur voor de afspraaktijd niets meer mag eten, drinken of roken.

Hoe verloopt het onderzoek?

- Op aangeven van de radioloog mag u steeds een slok van een bekertje witte pap (contrastmiddel) nemen. Door deze pap wordt uw slokdarm en/of maag zichtbaar. Wanneer vooral uw maag moet worden afgebeeld, krijgt u een injectie in de arm. Dit is om het samentrekken van de maag tijdelijk stil te leggen.
- Vervolgens worden er foto's gemaakt terwijl u ligt en staat. Er zal u gevraagd worden in verschillende richtingen te draaien.
- Zijn alle foto's gemaakt dan bekijken we meteen of ze voldoende duidelijk zijn. Soms is het nodig nog wat aanvullende foto's te maken.
- Tijdens het onderzoek vertellen we u steeds wat er gaat gebeuren. Ook kunt u tijdens het onderzoek vragen stellen.
- Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Uitslag van het onderzoek

De afdeling Radiologie zorgt dat de uitslag van het onderzoek naar uw behandelend arts gestuurd wordt. U spreekt met uw specialist af wanneer hij/zij de uitslag met u zal bespreken.

Belangrijk

Gebruikt u medicijnen die u 's ochtends moet innemen? Overleg dan met uw verwijzend arts of deze medicijnen later op de dag ingenomen mogen worden.

Begeleiding

We begrijpen dat u eventueel een begeleider/ster meeneemt naar het onderzoek. Dit kan een grote steun voor u zijn. Maar het verrichten van een onderzoek vergt echter uiterste concentratie van de onderzoeker. En het feit dat er gewerkt wordt met röntgenstraling, brengt met zich mee dat uw begeleider/ster niet mee kan gaan de onderzoekskamer in. Hij/zij kan wachten in het kleedkamertje of in de wachtkamer.



In overleg met de laborant kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld als u mee komt als begeleider van een kind of iemand met een beperking.

Wij vragen uw begrip voor deze gang van zaken.

Informatie voor diabetespatient

Bent u diabetespatient en gebruikt u daarvoor medicijnen? Doe dan het volgende:

- tabletten: neem uw tabletten in na het onderzoek, tegelijk met een maaltijd.
- insuline: direct na het onderzoek kunt u de ochtendinjectie zoals gebruikelijk spuiten. Doe dit tegelijk met een maaltijd.

Neem uw zelfcontrolemeter (indien u die heeft) mee naar het ziekenhuis, zodat u zonodig uw bloedglucose kunt meten. Zorg dat u glucosetabletten bij u heeft voor een eventuele hypo.

Nazorg

De eerste dagen na het onderzoek zult u bij de ontlasting nog resten van de witte contrastpap vinden. Ook kunt u last hebben van een moeizame stoelgang. Extra water drinken kan helpen, om dit zoveel mogelijk te voorkomen.