



Endo-Sponge

Uw arts heeft voorgesteld om een Endo-sponge® (spons) bij u te plaatsen. In deze folder leest u wat de behandeling inhoudt. Ook wordt beschreven wat u tijdens en na de behandeling kunt verwachten.


Hoe werkt een Endo-Sponge®?

Een Endo-Sponge® wordt in de darmholte ingebracht via uw anus en is met een slangetje verbonden aan een vacuümpot (Redyrob®). Het vuil uit de darmholte komt via het slangetje terecht in de vacuümpot, die u bij u draagt. Op deze manier wordt de holte schoongehouden. Dit bevordert het herstel. De spons wordt twee keer per week vervangen. Geleidelijk wordt de holte steeds kleiner, tot deze uiteindelijk dichtgroeit. De arts beoordeelt de holte en plaatst indien nodig direct een nieuwe spons. Het vacuüm in het wondgebied veroorzaakt soms een pijnlijk gevoel dat na enkele minuten afzwakt. De slang wordt vastgeplakt op uw been of bil, zodat u mobiel bent en zich veilig kunt bewegen. Het wisselen van de Endo-Sponge® duurt gemiddeld 20 minuten. De behandeling met de Endo-Sponge® varieert van een paar weken tot een paar maanden. Dit hangt af van de omvang van de holte en het tempo van het genezingsproces.

De behandeling

Tijdens de behandeling ligt u op uw linkerzijde. U kunt de behandeling als vervelend en pijnlijk ervaren. Daarom krijgt u een roesje toegediend. Het roesje bestaat uit een pijnstiller en/of een ontspanningsmiddel. Het medicijn maakt u wat slaperig en vermindert uw reactievermogen. Tijdens het onderzoek krijgt u medicatie waardoor u minder snel reageert. U mag daarom na het onderzoek niet zonder begeleiding van een familielid of een ander naar huis. Ook mag u na het onderzoek de eerste 24 uur niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer (Het is wettelijk niet toegestaan om op de dag van de behandeling zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.). U bent de eerste 24 uur na de ingreep niet verzekerd voor dergelijke verkeersongevallen en Gelre Ziekenhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld. Het gebruik van een taxi, zonder begeleiding, is ook niet toegestaan. Drink na het onderzoek de eerste 24 uur geen alcohol, neem geen belangrijke beslissingen en bedien geen gevaarlijke machines.

Indien u voor een vervolgbehandeling komt, wordt de oude spons voorafgaand aan het onderzoek op de Endoscopie-afdeling via het slangetje dat eraan zit, al voorbereid. Deze voorbereiding bestaat uit het weken van de spons met een verdovende vloeistof waardoor de arts deze makkelijker kan verwijderen. Dit doet geen pijn. U gaat dan naar de behandelkamer. Hier krijgt u een slaapmiddel (roesje) voor de behandeling zelf. Eerst zal de MDL-arts de oude spons verwijderen. Tijdens het onderzoek schuift de MDL-arts de endoscoop (kijk slang) voorzichtig via de anus naar binnen. Vervolgens zal de MDL-arts de holte en het wondgebied bekijken en indien nodig een nieuwe spons plaatsen.





Na de behandeling

De uitslag

Na afloop van de behandeling brengen wij u naar de nazorg. Bij een volgend consult informeren wij u uitgebreider over de bevindingen tijdens de behandeling en het onderzoek.

Vacuümtherapie

Na het plaatsen van de Endo-Sponge® zal een verpleegkundige de vacuümpot aansluiten op de Endo-Sponge®. Door het vacuüm wat hiermee wordt gecreëerd, krijgt de spons zijn zuigende werking. Hoewel de slang die van de spons naar de pot gaat, op uw been of bil kan worden vastgeplakt, zult u de pot los moeten meedragen.

De aangesloten pot geeft 2 zaken aan

1. Het vacuüm is af te lezen op de blauwe indicatie streep die u ziet.
2. Daarnaast zit bovenop de pot een witte dop. Deze bepaalt de sterkte van het vacuüm. De verpleegkundige zal deze instellen op stand 1. Dit is vanuit de producent vastgesteld als de stand voor een optimale werking van de Sponge. De vacuümstand van de pot mag **NIET** veranderd worden.



Wanneer de blauwe indicator van de vacuümpot naar de bodem is gezakt, betekent dit dat het vacuüm van de pot af is. Indien dit gebeurt dient u contact op te nemen met het ziekenhuis.

Complicaties

De kans bestaat dat door het verwijderen van de spons een lichte bloeding ontstaat. Gebeurt dit tijdens de behandeling, dan zal de endoscopist dit gelijk verhelpen. Indien u na het onderzoek last krijgt van een nabloeding volgt u dan de leefregels van de nazorg brief.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten:

- Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur
- telefoon: 088 – 105 3355
- of kijk op www.gelreziekenhuizen.nl