



Herpes Simplex van het mondslijmvlies

Ook wel bekend als “Koortslip”

U heeft last van pijnlijke blaasjes of zweertjes op verschillende plekken in uw mond of u heeft last van koortsuitslag op de boven- en/of onderlip. Door de arts is de diagnose herpes simplex virus infectie gesteld, ook kortweg herpes genoemd. Over de mogelijke oorzaken en behandeling hiervan is met u gesproken. Deze folder vat die informatie nog eens samen en geeft antwoorden op de meest gestelde vragen.

Wie hebben er last van en hoe vindt besmetting plaats?

Vrijwel iedereen is al op kinderleeftijd met talrijke virussen, waaronder het herpes simplex virus (HSV), in aanraking gekomen. Besmetting vindt voornamelijk plaats door direct contact met het virus. Besmetting is mogelijk via huid- of slijmvliescontact (zoenen, seksueel contact), maar soms ook via bepaalde gebruiksvoorwerpen. Ook door aanraking met de vingers van de herpesuitslag kan het virus worden overgebracht. De mogelijkheid bestaat dat daardoor de herpesinfectie ook op een andere plaats van het lichaam wordt overgebracht.

Oorzaak en verschijnselen

Het virus blijft levenslang in het lichaam aanwezig en kan onder sommige omstandigheden weer de kop opsteken. Zo kunnen zonlicht, stress, menstruatie of allergie het virus activeren en vervolgens ziekteverschijnselen veroorzaken. Wanneer het lichaam voor het eerst wordt besmet met HSV spreken wij van een primaire infectie; deze wordt meestal niet opgemerkt, maar kan soms ook zeer heftig verlopen met koorts en een algemeen ziektegevoel. De meest voorkomende vorm van herhaaldelijk optredende HSV-infectie is herpes rond de lippen (ook wel koortsuitslag genoemd). Sommige patiënten hebben maar enkele malen in hun leven last van weer opspelende herpes, terwijl anderen er vrij vaak mee worden geconfronteerd. Meestal zijn de ergste klachten na een week weer verdwenen.

Behandeling

Er is nog geen behandeling voor het herpes virus voorhanden, die het virus onschadelijk maakt of voorkomt dat het steeds weer actief kan worden. Er is ook geen vaccin beschikbaar dat mensen immuun voor dit virus zou kunnen maken.



Voor het bestrijden van de koorts en de pijn kunt u van de gangbare pijnstillers gebruik maken, bijvoorbeeld paracetamol. Het is belangrijk de mond zo goed mogelijk schoon te houden en eventueel een mondspoeling te gebruiken. Het heeft geen zin om antibiotica of zogenaamde antivirale tabletten te slikken. Ook het gebruik van zalfjes bij een koortslip is over het algemeen niet zinvol.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Kaakchirurgie in de locatie waar u behandeld wordt.

Gelre ziekenhuizen Apeldoorn

- maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.00 uur, tel 055 - 581 18 06
- polikaakchirurgieapeldoorn@gelre.nl
- buiten kantooruren via receptie/ Spoedeisende Hulp, tel: 055 – 581 81 81

Gelre ziekenhuizen Zutphen

- maandag t/m vrijdag 8.30 - 16.30 uur, tel 0575 - 59 28 22
- polikaakchirurgiezutphen@gelre.nl
- buiten kantooruren via receptie/ Spoedeisende Hulp, tel: 0575 – 592 592

*Deze informatie is afkomstig van Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, de wetenschappelijke vereniging van kaakchirurgen in Nederland
Zie: www.kaakchirurg.nl*