



# Bodybox, spirometrie en diffusietest met medicatie

In overleg met uw behandelend arts bent u verwezen voor een uitgebreid longfunctie-onderzoek. Hierbij wordt het functioneren van uw longen onderzocht zowel voor als na inhalatie van luchtwegverwijdende medicatie. Deze folder geeft informatie over hoe dit onderzoek verloopt en wat van u verwacht wordt.

## Vorbereiding

- In verband met het onderzoek moet u **stoppen** met het gebruiken van uw **longmedicatie**, zie het schema 'Stoppen met medicatie'. Overige medicatie kunt u blijven gebruiken.
- Indien u behalve dit onderzoek ook een **Histamineprovocatietest** heeft, kunnen daar **alternatieve stakingstijden** zijn voor de medicatie. Zie hiervoor het schema 'Stoppen met medicatie' bijgevoegd bij de folder voor de Histamineprovocatietest.
- Het is verstandig om vanaf twee uur voor het onderzoek geen zware inspanning te verrichten en tien minuten voor aanvang aanwezig te zijn, zodat u rustig en ontspannen aan het onderzoek kan beginnen.
- Belangrijk is dat u vanaf twee uur voor het afgesproken tijdstip **niet rookt**.
- U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek.

## Het onderzoek

- Voorafgaand aan het onderzoek worden uw lengte en gewicht gemeten.
- U neemt plaats op een stoel in een doorzichtige cabine waarvan de deur open blijft.
- Hierna krijgt u een mondstuk in uw mond en een klemmetje op uw neus. Via het mondstuk kunt u normaal verder ademen.
- Vervolgens voert u een aantal ademhalingstesten uit.
- Voor het vervolg van het onderzoek wordt de deur van de cabine enkele minuten gesloten, deze kan ten allen tijde van binnenuit worden geopend.
- Hierna krijgt u luchtwegverwijdende medicatie. Na 15-30 minuten inwerktijd zal het bovenstaande onderzoek herhaald worden.
- Tevens zal de snelheid worden gemeten waarmee uw longen zuurstof doorgeven aan uw bloed. Hiervoor wordt u gevraagd om uw adem tien tellen vast te houden.
- Naar aanleiding van de uitkomsten kan het noodzakelijk zijn om aanvullend onderzoek uit te voeren. Indien dit voor u van toepassing is zal de longfunctieanalist dit met u bespreken.

Het gehele onderzoek is pijnloos en duurt 60 minuten.



## Uitslag van het onderzoek

De uitslag van dit onderzoek krijgt u van uw behandelend arts in het ziekenhuis.

## Verhinderd?

Bent u verhinderd? Bel dan minimaal 24 uur vóór uw afspraak naar het ziekenhuis om dit door te geven. In uw plaats helpen we graag een andere patiënt.

## Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel ze dan gerust aan de medewerkers van de polikliniek Longziekten in Apeldoorn of Longgeneeskunde in Zutphen.

## Bereikbaarheid

### Gelre Apeldoorn

Polikliniek Longziekten  
ma t/m vrij 8.30 – 16.30 uur  
Tel: 055 – 581 84 10

### Gelre Zutphen

Polikliniek Longgeneeskunde  
ma t/m vrij 8.30 – 16.30 uur  
Tel: 0575 – 592 810

## Aanmelden voor het onderzoek

### Gelre Apeldoorn

Polikliniek Longziekten route 158

### Gelre Zutphen

Biometrie afdeling route 21

## Voor meer informatie

[www.gelreziekenhuizen.nl/biometrie](http://www.gelreziekenhuizen.nl/biometrie)



## Stoppen met medicatie voor spirometrie

### 6 uur van te voren

<i>(merknaam)</i>	<i>(stofnaam)</i>
Airomir	Salbutamol
Bricanyl	Terbutaline
Ventolin	Salbutamol

### 12 uur van te voren

<i>(merknaam)</i>	<i>(stofnaam)</i>
Atrovent	Ipratropium
Berodual	Fenoterol / Ipratropium
Combivent	Salbutamol / Ipratropium

### 36 uur van te voren

<i>(merknaam)</i>	<i>(stofnaam)</i>
AirFluSal Forspiro	Salmeterol / Fluticason
Atimos	Formoterol
Bufoleer Eashaler	Formoterol / Budesonide
Busalair	Salmeterol / Budesonide
DuoResp Spiromax	Formeterol / Budesonide
Elpenhaler	Salbutamol / Fluticason
Flutiform	Formoterol / Fluticason
Foradil	Formoterol
Foster	Formoterol / Beclometason
Oxis	Formoterol
Seretide	Salmeterol / Fluticason
Serevent	Salmeterol
Singulair	Montelukast
Symbicort	Formoterol / Budesonide

Patiënteninformatie wordt met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie.

U kunt aan deze uitgave geen rechten ontlenen.

© Gelre ziekenhuizen  
www.gelreziekenhuizen.nl



## 48 uur van te voren

<i>(merknaam)</i>	<i>(stofnaam)</i>
Anoro	Umeclidinium / Vilanterol
Atectura Breezhaler	Mometason / Indacaterol
Bevespi	Glycopyrronium / Formoterol
Daxas	Roflumilast, actieve metaboliet
Duaklir Genuair	Aclidinium / Formoterol
Eklira Genuair	Aclidinium
Energair Breezhaler	Indacaterol / Glycopyrronium / Mometason
Incruse	Umeclidinium
Onbrez Breezhaler	Indacaterol
Relvar	Fluticasonfuroaat / Vilanterol
Seebri Breezhaler	Glycopyrronium
Spiolto	Tiotropium / Olodaterol
Spiriva	Tiotropium
Striverdi	Olodaterol
Theolair Retard	Theofylline
Tiotrus	Tiotropium
Trimbow	Beclometason / Formoterol / Glycopyrronium
Trelegy Ellipta	Fluticason / Vilanterol / Umeclidinium
Ultibro Breezhaler	Indacaterol / Glycopyrronium
Xoterna	Indacaterol / Glycopyrronium

Het is **niet** nodig met de volgende medicatie te stoppen:

<i>(merknaam)</i>	<i>(stofnaam)</i>
Qvar	Beclometason
Flixotide	Fluticasonpropionaat
Pulmicort	Budesonide
Alvesco	Ciclesonide

Indien het stoppen van uw luchtwegmedicatie niet mogelijk is, meldt u dan bij aanvang van het onderzoek welke medicijnen u wel gebruikt heeft.