



Medicijnen bij dementie

Helaas is er nog geen medicijn gevonden dat dementie kan genezen. Voor een aantal vormen van dementie zijn in Nederland wel medicijnen beschikbaar. Deze medicijnen kunnen de gevolgen van de ziekte beperken en het beloop vertragen. Maar ze hebben ook bijwerkingen.

Voor het behandelen van alzheimer dementie, parkinson dementie en Lewy body dementie zijn medicijnen beschikbaar. Voor de andere vormen van dementie zijn deze medicijnen niet geschikt. Op de polikliniek geriatrie van Gelre ziekenhuizen gebruiken we galantamine of rivastigmine. Deze medicijnen horen tot de groep cholinesteraseremmers.

Werking cholinesteraseremmers

Bij alzheimer dementie is de concentratie van de neurotransmitter acetylcholine in de hersenen verlaagd. Deze neurotransmitter heeft iedereen nodig om zijn geheugen goed te laten werken en ook om zich energiek en actief te voelen. Een cholinesteraseremmer zoals galantamine of rivastigmine, houdt de afbraak van deze neurotransmitter tegen. Hierdoor blijft de overdracht van informatie in de hersenen langer intact. Het middel heeft een bescheiden effect bij een klein deel van mensen met alzheimer. Dit is merkbaar aan mogelijke verbetering van de aandacht, de concentratie en het spraakvermogen. Het geheugen wordt er niet beter van. Mantelzorgers geven aan dat hun naaste, die een cholinesteraseremmer neemt, er meer bij is, weer meedoet en gesprekken kan voeren. Bij mensen met parkinson dementie en Lewy body dementie kan het middel de alertheid verbeteren en hallucinaties (bijvoorbeeld: iets zien wat er niet is) laten afnemen.

Galantamine is verkrijgbaar in capsules. Rivastigmine is verkrijgbaar in capsules en in een pleister. De capsules kunt u het beste innemen tijdens of na het eten. De rivastigmine pleister laat u eenmaal per dag op de huid aanbrengen, bij voorkeur op de rug.

Bijwerkingen

Galantamine en rivastigmine kunnen bijwerkingen hebben. De belangrijkste (mogelijke) bijwerkingen zijn:

- Misselijkheid
- Braken
- Gebrek aan eetlust
- Duizeligheid
- Hoofdpijn
- Slaperigheid
- Lagere hartslag
- Roodheid en jeuk (bij de rivastigminepleister)

De bijwerkingen treden vooral op als u net met de medicatie bent begonnen en ook wanneer de dosis in stappen wordt verhoogd tot de optimale dosering. Bij ernstige



bijwerkingen mag u de medicatie direct staken en hoeft u het niet af te bouwen. Neem contact op met de polikliniek Geriatrie als u zich zorgen maakt om de bijwerkingen:

- tijdens kantooruren;
- via telefoonnummer: 055 - 581 83 95 voor locatie Apeldoorn en Zutphen;
- buiten kantooruren via de huisartsenpost als het niet kan wachten tot de volgende werkdag.

Kijk voor meer informatie over deze medicijnen en de mogelijke bijwerkingen op www.apotheek.nl

De informatie in deze folder is een bewerking van de tekst op www.dementie.nl

