



Histamineprovocatietest

In overleg met uw behandelend arts bent u verwezen voor een histamineprovocatietest. Bij dit onderzoek wordt de gevoeligheid van de longen gemeten. Deze folder geeft informatie over hoe dit onderzoek verloopt en wat van u verwacht wordt.

Vorbereiding

- In verband met het onderzoek moet u **stoppen** met het gebruiken van uw **long- en anti allergie medicatie**, zie het bijgevoegde schema 'Stoppen met medicatie voor histamineprovocatietest'. Overige medicatie kunt u blijven gebruiken.
- Het is verstandig om vanaf één uur voor het onderzoek geen zware inspanning te verrichten en tien minuten voor aanvang aanwezig te zijn, zodat u rustig en ontspannen aan het onderzoek kan beginnen.
- U mag vanaf één uur voor het afgesproken tijdstip **niet roken en/of vaperen**.
- U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek.
- Bent u momenteel bezig met een antibiotica- of prednisonkuur voor een **luchtweginfectie**? Neemt u dan **contact** met ons op.

Het onderzoek

- U ademt, via verneveling, in oplopende dosering een histamine oplossing in.
- Na elke verneveling wordt gemeten hoe uw luchtwegen hierop reageren.
- Gedurende dit onderzoek kunt u gaan hoesten, kortademig en/of benauwd worden.
- Bij een bepaalde daling van uw longfunctie of bij heftige toename van klachten wordt de provocatie gestaakt en krijgt u luchtwegverwijdende medicatie.
- Na het inwerken van deze medicatie wordt het herstel van uw longfunctie gemeten.
- Na het onderzoek kunt u een lichte keelpijn, hoofdpijn, heesheid of prikkelhoest ervaren. Deze klachten zullen vanzelf overgaan.

Het gehele onderzoek duurt ongeveer 60 minuten.



Uitslag van het onderzoek

De uitslag van dit onderzoek krijgt u van uw behandelend arts in het ziekenhuis.

Verhinderd?

Bent u verhinderd? Bel dan minimaal 24 uur vóór uw afspraak naar het ziekenhuis om dit door te geven. In uw plaats helpen we graag een andere patiënt.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel ze dan gerust aan de medewerkers van de polikliniek Longgeneeskunde.

Bereikbaarheid

Polikliniek Longgeneeskunde

ma t/m vrij 8.30 – 16.30 uur

Tel: 088 – 105 33 73

Aanmelden voor het onderzoek

Gelre Apeldoorn

Route 158

Gelre Zutphen

Route 21

Voor meer informatie

www.gelreziekenhuizen.nl/biometrie_1

Stoppen met medicatie voor histamineprovocatietest

6 uur van te voren

(merknaam)

Airomir

Bricanyl

Ventolin

(stofnaam)

Salbutamol

Terbutaline

Salbutamol

12 uur van te voren

(merknaam)

Atrovent

Berodual

Combivent

(stofnaam)

Ipratropium

Fenoterol / Ipratropium

Salbutamol / Ipratropium

24 uur van te voren (1 dag)

(merknaam)

Sandomigran

(stofnaam)

Pizotifeen (anti-migraine)



36 uur van te voren

<i>(merknaam)</i>	<i>(stofnaam)</i>
AirFluSal Forspiro	Salmeterol / Fluticason
Atimos	Formoterol
Bufoleer Eashaler	Formoterol / Budesonide
Busalair	Salmeterol / Budesonide
DuoResp Spiromax	Formoterol / Budesonide
Elpenhaler	Salbutamol / Fluticason
Flutiform	Formoterol / Fluticason
Foradil	Formoterol
Foster	Formoterol / Beclometason
Oxis	Formoterol
Seretide	Salmeterol / Fluticason
Serevent	Salmeterol
Singulair	Montelukast
Symbicort	Formoterol / Budesonide

48 uur van te voren (2 dagen)

<i>(merknaam)</i>	<i>(stofnaam)</i>
Aectura Breezhaler	Mometason / Indacaterol
Daxas	Roflumilast, actieve metaboliet
Onbrez Breezhaler	Indacaterol
Relvar	Fluticason / Vilanterol
Striverdi	Olodaterol
Theolair Retard	Theofylline

72 uur van te voren (3 dagen)

<i>(merknaam)</i>	<i>(stofnaam)</i>
Aerius	Desloratadine
Allerfre	Loratadine
Cinnarizine	Cinnarizine
Cyclizine	Cyclizine
Emesafene	Meclozine / Pyridoxine
Fenistil	Dimetindeen
Hydroxyzine	Hydroxyzine
Kestine	Ebastine
Ketotifen	Ketotifen
Mizollen	Mizolastine
Prevalin allerstop	Cetirizine
Primatour	Cinnarizine / Chloorcyclizine
Promethazine	Promethazine
Reactine	Cetirizine
Rupafin	Rupatadine
Semprex	Acrivastine
Suprimal	Meclozine
Tavegyl	Clemastine



Telfast	Fexofenadine
Toplexil	Oxomemazine
Xyzal	Levocetirizine
Zaditen	Ketotifen
Zyrtec	Cetirizine

168 uur van te voren (7 dagen)

<i>(merknaam)</i>	<i>(stofnaam)</i>
Anoro	Umeclidinium / Vilanterol
Bevespi	Glycopyrronium / Formoterol
Duaklir Genuair	Aclidinium / Formoterol
Eklira Genuair	Aclidinium
Energair Breezhaler	Indacaterol / Glycopyrronium / Mometason
Incruse	Umeclidinium
Seebri Breezhaler	Glycopyrronium
Spiolto	Tiotropium / Olodaterol
Spiriva	Tiotropium
Tiotrus	Tiotropium
Trimbow	Beclometason / Formoterol / Glycopyrronium
Trelegy Ellipta	Fluticason / Vilanterol / Umeclidinium
Ultibro Breezhaler	Indacaterol / Glycopyrronium
Xoterna	Indacaterol / Glycopyrronium

Het is **niet** nodig met de volgende medicatie te stoppen:

<i>(merknaam)</i>	<i>(stofnaam)</i>
Qvar	Beclometason
Flixotide	Fluticasonpropionaat
Pulmicort	Budesonide
Alvesco	Ciclesonide

Indien het stoppen van uw luchtwegmedicatie niet mogelijk is, meldt u dan bij aanvang van het onderzoek welke medicijnen u wel gebruikt heeft.