



Aanvullende informatie echo-geleid verwijderen fibroadenoom (Mirabel procedure)

Vorbereiding

Wanneer u bloedverdunners gebruikt, is het van belang dat u dit gebruik in overleg met uw arts aanpast om de kans op nabloeding zoveel mogelijk te beperken. Andere medicijnen kunt u gewoon innemen.

Korte beschrijving onderzoek

- Binnenkort komt U bij ons op de afdeling radiologie om echogeleid een fibroadenoom te laten verwijderen.
- De behandeling vindt plaats onder begeleiding van echografie en een biopsienaald, die is verbonden met een vacuümzuiger.
- Er wordt steriel gewerkt en de omgeving van de borst zal steriel worden afgedekt.
- De borst zelf wordt gedesinfecteerd.
- Daarna krijgt u een lokale verdoving. Een bijkomend voordeel van de verdoving is dat de bloedvaatjes vernauwen. Hierdoor wordt bloedverlies zoveel mogelijk voorkomen.
- Vervolgens kan er via een klein sneetje in de huid een de biopsienaald worden ingebracht.
- Het fibroadenoom wordt nu reepje voor reepje verwijderd met de vacuümzuiger. Dit systeem maakt tijdens de hele procedure een brommend geluid.
- De behandeling gaat door totdat het fibroadenoom niet of nauwelijks meer zichtbaar is.
- Er ontstaat vrijwel altijd een bloeditstorting in het gebied waar het biopt genomen is. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen wordt het gebied na afloop van de behandeling tenminste 10 minuten dichtgedrukt.
- Het wondje wordt met hechtstrips dichtgeplakt en verbonden.
- De procedure neemt ongeveer 45 minuten in beslag.

Uitslag van het onderzoek

De afdeling Radiologie zorgt dat de uitslag van het onderzoek naar uw behandelend arts gestuurd wordt. U spreekt met uw specialist af wanneer hij/zij de uitslag met u zal bespreken.



Complicaties

De kans op complicaties is gering. In enkele gevallen kunnen de volgende complicaties zich voordoen:

- Napijn
- Nabloeding/lage bloeddruk

Bij pijnklachten kunt U, als U op een verpleegafdeling bent opgenomen de verpleegkundige om pijnstillers vragen. Thuis kunt U bijvoorbeeld paracetamol 500 mg (max. 6 tabletten/24 uur) innemen.

Er ontstaat vrijwel altijd een bloeditstorting in het gebied waar het biopt genomen is..

Begeleiding

Hoewel de radiologen en radiologisch laborant(e) begrip hebben voor het feit dat uw eventuele begeleider/ster een grote steun voor u betekent bij een ziekenhuisbezoek, wordt hen gevraagd de onderzoekkamer tijdens het onderzoek te verlaten en te wachten in het kleedkamertje of in de wachtkamer. Het verrichten van een onderzoek vergt uiterste concentratie van de onderzoeker. Wij vragen uw begrip voor deze gang van zaken. In overleg met de laborant kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld als u mee komt als begeleider van een kind.