

Coloscopie bij kinderen

2 – 4 jaar

In overleg met de behandelend arts van uw kind wordt bij uw kind een coloscopie uitgevoerd. In deze brochure leest u wat u moet doen ter voorbereiding van dit onderzoek.

De scopie wordt in principe ingepland door kinderarts MDL op het kinderscopie-programma, wat elke 2 weken op de maandagmiddag plaatsvindt.

Wat is een coloscopie?

Coloscopie is een onderzoek van de gehele dikke darm. Met een endoscoop wordt in de darm gekeken. Een endoscoop is een flexibele slang met een camera. De arts bekijkt met behulp van deze scoop de binnenkant van de darm.

Filmpje van het onderzoek

Bekijk een filmpje over het onderzoek op www.gelreziekenhuizen.nl/Darmonderzoek-bij-kinderen

Vorbereiding

Tijdens het onderzoek mogen er geen voedselresten in de dikke darm voorkomen. Deze voedselresten kunnen het zicht belemmeren. Zonder voedselresten kan de arts goed beoordelen of het dikke darmslijmvlies bij uw kind gezond of ziek is. Als tijdens het onderzoek onverhoopt blijkt dat de darm niet schoon is, bestaat de kans dat het onderzoek mislukt en opnieuw gedaan moet worden. Het is daarom uiterst belangrijk dat uw kind een goede voorbereiding krijgt om de darm schoon te maken.

Schoonmaken van de darmen

Het schoonmaken van de darm gebeurt door het drinken van een laxeerdrank en een minimale hoeveelheid helder drinken en op de dag van onderzoek het spoelen van de darm.

Wijze van oplossen Picoprep

1 zakje natriumpicosulfaat/magnesiumcitraat (Picoprep®) poeder voor drank 16,1 g (Picoprep®) oplossen in 150-200 ml koud water, 2-3 min roeren en dan opdrinken. Soms wordt de oplossing warm, dan wachten tot het afgekoeld is.

Uitslag van het onderzoek

Voordat u met uw kind naar huis gaat, hoort u de voorlopige uitslag van het onderzoek en wordt verdere beleid uitgelegd. De afgenomen stukjes weefsel (biopten) worden onderzocht

onder de microscoop in een laboratorium. De uitslag is na ongeveer 7 werkdagen bekend. Deze uitslag wordt telefonisch of tijdens een polikliniekbezoek met u besproken.

De scopie vindt plaats op

Dag -3: (vrijdag)	
Ouder moet tussen 14.00 uur en 15.00 uur bellen naar de afdeling Kind & Jeugd (055-5811575) voor:	
- scopie-tijd / aanwezigheid afdeling	
- nuchter beleid (helder vloeibaar tot 2 uur voor OK)	

Dag -2: (zaterdag)	
Voeding:	Normaal dieet
Ca 19.00 uur	< 2 jaar: geen bisacodyl 2-4 jaar: 1 bisacodyl tablet (5 mg)

Dag -1: (zondag)	
Voeding:	Bakje yoghurt (zonder stukjes) of vla als ontbijt, erna alleen helder vloeibaar (geen maaltijden!)
9.00 uur	1 zakje natriumpicosulfaat/magnesiumcitraat (Picoprep®) poeder voor drank 16,1 g (Picoprep®) oplossen in 200 ml water, hiervan 100 ml laten opdrienen
Hierna elk uur 75 tot 125 ml helder vloeibaar (bijv. water, thee, appelsap, ijsthee, aangelengd limonadesiroop (geen rode), heldere bouillon), tot volgende gift Picoprep® (Liefst minimaal 1x bouillon drinken vanwege zoutverlies na diarree)	
15.00 uur	De andere helft (= 100 ml) van de Picoprep® oplossing drinken
Vervolgens elk uur 75 tot 125 ml helder vloeibaar tot circa 20:00 uur	

Dag 0: (maandag/ dag van de scopie)	
Voeding:	Helder vloeibaar tot nuchtertijd
Na binnenkomst op DVP Kind & Jeugd	Rectaal spoelen via een slangetje met lauw warm water (25 ml/kg)
's Middags	Coloscopie (duur ca 1 uur) +/- duodenoscopie (afhankelijk van indicatie)

Heeft u na het lezen van deze brochure vragen? Neem dan contact op met uw behandelend arts.