



EBUS onderzoek

In overleg met uw behandelend arts ondergaat u binnenkort een EBUS onderzoek. Deze folder geeft u informatie over wat dit onderzoek inhoudt, het verloop van dit onderzoek en wat van u wordt verwacht.

Afspraak

Voor het onderzoek wordt u verwacht op:

..... dag,-.....- 20..... om uur,

in Gelre ziekenhuizen locatie, afdeling

route, ...^e verdieping.

Gelre ziekenhuizen heeft 2 locaties: Apeldoorn en Zutphen. Bronchoscopieën kunnen op beide locaties worden gedaan. In deze folder wordt steeds specifieke informatie voor beide locaties gegeven omdat de plaats, telefoonnummers enz. niet hetzelfde zijn.

Wat is een EBUS onderzoek?

Een EBUS is een onderzoek waarmee de tussen de longen gelegen lymfeklieren onderzocht kunnen worden. Het onderzoek gebeurt met een EBUS-scoop. Dit is een dunne, flexibele en bestuurbare slang met aan het uiteinde een klein echo-apparaat. Daarmee worden opnamen van de organen en lymfeklieren gemaakt. Met een dunne naald kan de arts tijdens het onderzoek weefsel afnemen. Dit weefsel wordt microscopisch onderzocht om een diagnose te kunnen stellen.

Vorbereidingen

Eten en drinken

Voor het onderzoek is het belangrijk dat u nuchter bent. Dit betekent dat u de avond voor het onderzoek vanaf 24.00 uur niet meer mag eten. U mag tot 3 uur voor het onderzoek helder vloeibaar drinken.

Vindt het onderzoek 's middags plaats na 13.00 uur? Dan mag u 's ochtends een licht ontbijt nemen (1 beschuit en 1 kop thee).

Het gebruik van een spray of inhalator is wel toegestaan. Ook mag u wel uw tanden poetsen.



Vervoer naar en van het ziekenhuis

Tijdens het onderzoek krijgt u medicatie waardoor u minder snel reageert. U mag daarom na het onderzoek niet zonder begeleiding van een familielid of een ander naar huis. Ook mag u na het onderzoek de eerste 24 uur niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer (Het is wettelijk niet toegestaan om op de dag van de behandeling zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.). U bent de eerste 24 uur na de ingreep niet verzekerd voor dergelijke verkeersongevallen en Gelre Ziekenhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld. Het gebruik van een taxi, zonder begeleiding, is ook niet toegestaan. Drink na het onderzoek de eerste 24 uur geen alcohol, neem geen belangrijke beslissingen en bedien geen gevaarlijke machines.

Uw begeleiding tijdens het onderzoek

Na het onderzoek mag u niet alleen naar huis. Dit betekent dat u enkel onder begeleiding van een contactpersoon de afdeling mag verlaten. U mag dus ook niet alleen naar beneden. Ook mag u niet alleen met de taxi naar huis. Als er een contactpersoon bij is, mag u wel met de taxi of het openbaar vervoer naar huis. Uw contactpersoon moet u begeleiden tot u thuis bent.

Als er géén begeleiding naar huis is na het onderzoek: dan kan het onderzoek niet met een roesje uitgevoerd worden en dan doen we het zonder roesje.

U heeft een persoon meegenomen voor uw begeleiding naar huis na het onderzoek. Als u door de verpleegkundige wordt opgehaald uit de wachtkamer voor het onderzoek, dan krijgt uw begeleider uitleg én het tijdstip waarop hij/zij in de uitslaapkamer aanwezig moet zijn. Uw begeleider kan tot die tijd wachten in de wachtkamer of in de centrale hal. Laat uw begeleider een rolstoel meenemen vanuit de centrale hal (borg € 1,-). Op de locatie Zutphen hoeft u geen borg voor de rolstoel mee te nemen. Door de medicatie die u tijdens het onderzoek krijgt, kunt u zich minder fit voelen. Daarom moet u in een rolstoel vervoerd worden naar de auto. Is het voor uw begeleider niet mogelijk om gedurende het onderzoek te blijven? Dan nemen wij voordat het onderzoek start telefonisch contact op met hem/haar. Het is de bedoeling dat uw begeleider binnen 30 minuten in het ziekenhuis aanwezig kan zijn. Dit is in verband met het geven van de voorlopige uitslag van het onderzoek door de verpleegkundige of eventueel de arts. Zonder contact vooraf met uw begeleider kan het onderzoek niet doorgaan. Indien u bent opgenomen in het ziekenhuis hoeft de begeleiding niet aanwezig te zijn en zult u de uitslag te horen krijgen wanneer u weer terug bent op de afdeling.

Medicatie

Gebruikt u medicijnen zoals bloedverdunners of medicijnen voor diabetes? Overleg dan met de arts die het onderzoek voor u aanvraagt of u met deze medicijnen tijdelijk moet stoppen voor het onderzoek.

Heeft u een afwijking van de hartklep? Meld dit dan bij uw arts. Het kan zijn dat u voor het onderzoek medicijnen krijgt ter voorkoming van een infectie.

Waar vindt het onderzoek plaats?

Het onderzoek vindt plaats op de Endoscopie afdeling van Gelre ziekenhuizen. In apeldoorn is dit op de 2^e verdieping en kunt u zich daar melden bij de gastvrouw (indien aanwezig). In Zutphen kunt u zich aanmelden op de aanmeldzuil in de wachtkamer. Daarna kunt u in de wachtkamer plaatsnemen.

Time-out procedure



Op de Endoscopie-afdeling werken wij volgens landelijke kwaliteitseisen vóór elk onderzoek met de zogenaamde Time-out procedure. Dit betekent dat we u op verschillende momenten dezelfde vragen stellen, bijvoorbeeld 'wat is uw geboortedatum?' Dit doen we om uw veiligheid te waarborgen.

Het onderzoek

Op de Endoscopie afdeling wordt u verder voorbereid. U kunt dan eventuele vragen naar aanleiding van deze brochure stellen. U krijgt een infuus. Daarna wordt u naar de onderzoekskamer gebracht.

Op de onderzoekskamer worden vlak voor het onderzoek uw keel en luchtwegen verdoofd met een verdovingspray/druppels.

Na het verdoven van de keel, krijgt u via het infuus medicatie toegediend die u slaperig maakt. De arts brengt de scoop voorzichtig in via uw mond. Uw luchtwegen worden niet afgesloten door de scoop; u kunt gewoon blijven ademen. Met echobeelden kan de arts nu de tussen de longen gelegen lymfeklieren onderzoeken. Het is ook mogelijk om weefsel af te nemen voor verder onderzoek in het laboratorium.

Tijdens het onderzoek houden wij uw lichaamsfuncties als hartslag en zuurstofgehalte in het bloed goed in de gaten.

Het onderzoek duurt gemiddeld 30 minuten.

Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek wordt u naar de uitslaapkamer van de Endoscopie-afdeling gebracht waar u rustig kunt uitslapen en bijkomen van het onderzoek. Uw begeleider mag na het onderzoek direct weer bij u gaan zitten.



Uitslag van het onderzoek

Voor de uitslag van stukjes weefsel die weggenomen zijn, kunt u terecht bij de verwijzende arts na 5 tot 7 werkdagen.

Mogelijke complicaties

Complicatie bij de EBUS-echografie komen zeer zelden voor. Het is normaal dat u op de dag van het onderzoek wat keelpijn en bloederig slijm achter in uw keel heeft.

Contact opnemen

Krijgt u binnen 1 dag na het onderzoek een van de volgende klachten?

- toenemende kortademigheid
- veel bloed ophoesten
- koorts hoger dan 38 °C

Neem dan direct contact op met het ziekenhuis:

Apeldoorn:

- maandag t/m vrijdag 8:30 – 12:30 uur en 13:30 – 16:00
Secretariaat Endoscopie-afdeling, tel: 055 - 581 83 70

- Buiten deze tijden:

Spoedeisende Hulp, vraag naar de dienstdoende longarts, tel: 055 - 581 81 81
en vermeld dat u een EBUS onderzoek heeft gehad.

Zutphen:

Ma-vr: Endoscopie-afdeling 0575-592491

- Buiten deze tijden:

Spoedeisende Hulp, vraag naar de dienstdoende longarts, tel: 0575-5925
en vermeld dat u een EBUS onderzoek heeft gehad.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze brochure vragen? Neem dan contact op met de arts die dit onderzoek met u heeft afgesproken of met uw huisarts.