



Instructie MRSA kweken

Ongepooled inzetten

Deze instructie beschrijft hoe u bij uzelf MRSA kweken kunt afnemen. In uw geval is het belangrijk dat de kweken (keel, neus en perineum) in aparte kweekbuisjes naar het laboratorium worden gestuurd.

Aandachtspunten

- U neemt kweken af van keel, neus en perineum (KNP).
- Heeft u wonden of een aangetaste huid? Dan krijgt u een extra kweekset en een aanvraagformulier om deze ook op MRSA te testen.
- Heeft u een blaas- of suprapubische katheter? Dan krijgt u een urinekweekset en een aanvraagformulier om deze ook op MRSA te testen.
- Neem de kweken af op dezelfde dag dat u deze verstuurt of naar het laboratorium brengt. De kweek moet binnen 72 uur na afname op het laboratorium zijn.

Wat heeft u nodig?

- Een kweekset bestaande uit een verzendenvelop met daarin:
- Drie kweekbuisjes met kweekstokken in verpakking (TSB Salt Broth, blauwe dop)
- Aanvraagformulier MMI
- Patiëntstickers met uw gegevens
- Blister met absorberend materiaal (alleen indien ook urinekweek nodig is)
- Safetybag met plastic beschermhuls (afsluitbare zak met plakrand)
- Beker
- Afvalbak
- Indien van toepassing: urinekweekset met extra aanvraagformulier
- Indien van toepassing bij wond(en): Kweekbuisje met kweekstokken in verpakking met extra aanvraagformulier. (TSB Salt Broth, blauwe dop)

Vorbereiding

- Leg alle benodigdheden klaar.
- Controleer of het aanvraagformulier volledig is ingevuld.
- Vul zelf uw gegevens in als op het aanvraagformulier geen patiëntsticker zit.
- Noteer de afname datum en tijd op het aanvraagformulier.
- Vermeld op het aanvraagformulier of u antibioticum gebruikt, en zo ja, welke (naam en dosis antibioticum).



Instructie voor het afnemen van de kweken

- Haal voorafgaand aan elke kweekafname het kweekbuisjes uit de verpakking.
- Plak hier een patiëntsticker op of noteer hier naam en geboortedatum op.
- Schrijf op het kweekbuisje of de sticker de afnameplaats: K(keel), N(neus) of P(perineum).
- Draai het dopje van het kweekbuisje.
- Plaats het transportbuisje in een beker, zorg ervoor dat de vloeistof in het buisje blijft.



Stap 1 Keel

- Open een nieuwe verpakking en neem de witte kweekstok uit de verpakking.
- Neem de kweek af van de neus: strijk de kweekstok langs de keelboog (amandelen) achter in de keel.
- Steek de witte kweekstok in het buisje en breek dit af bij het breekpunt: de rode streep op de kweekstok.
- Draai de dop stevig op het buisje.
- De roze stokken in de verpakking mag u in de afvalbak deponeren.
- Controleer of uw naam, geboortedatum en "keel" op het buisje staan.

Stap 2 Neus

- Open een nieuwe verpakking en neem de witte kweekstok uit de verpakking.
- Neem de kweek af van de neus: maak een ronddraaiende beweging langs de binnenkant van beide neusvleugels.
- Steek de witte kweekstok in het buisje en breek dit af bij het breekpunt: de rode streep op de kweekstok.
- Draai de dop stevig op het buisje.
- De roze stokken in de verpakking mag u in de afvalbak deponeren.
- Controleer of uw naam, geboortedatum en "neus" op het buisje staan.

Stap 3 Perineum

- Neem de witte kweekstok uit de verpakking.
- Neem de kweek af van het perineum: strijk de kweekstok langs de huid tussen de anus en de geslachtsdelen.
- Steek de witte kweekstok in het buisje en breek dit af bij het breekpunt: de rode streep op de kweekstok.
- Draai de dop stevig op het buisje.
- De roze stokken in de verpakking mag u in de afvalbak deponeren.
- Controleer of uw naam, geboortedatum en "perineum" op het buisje staan.





Indien van toepassing

Instructie bij wonden of een aangetaste huid:

- Kweekset
- Aanvraagformulier MMI

Bij één wond:

- Open de verpakking met het kweekbuisje en kweekstokken in verpakking (TSB Salt Broth, blauwe dop). Neem de witte kweekstok uit de verpakking. Strijk met de kweekstok van binnen naar buiten over het wondoppervlak; neem eventueel aanwezig pus zoveel mogelijk mee.
- Steek de kweekstok in het busje en breek dit af bij het breekpunt: de rode streep op de kweekstok.
- Draai de dop stevig op het busje.
- De roze stokken in de verpakking mag u in de afvalbak deponeren.
- Controleer of uw naam, geboortedatum en 'wond' op het kweekbuisje staan.

Bij meer wonden:

- Herhaal bovenstaande procedure voor iedere wond of aangetaste huid.
- Draai de dop stevig op het busje.
- Controleer of uw naam, geboortedatum en 'wond' op het kweekbuisje staan.

Instructie bij blaas/ suprapubisch katheter:

- Urinekweekset.
- Aanvraagformulier MMI.
- Plak een patiëntsticker op de urinekweekset of noteer hier naam, geboortedatum.
- Noteer op de patiëntsticker of op het kweekset ook 'urine'.
- Vul de vacuum buis met urine volgens de instructie.

Verzenden materialen voor kweken

Via brievenpost

- Stop de kweekbuis/buizen in de blister met het absorberende materiaal eromheen.
- Stop de blister in de safetybag.
- Stop zo nodig de urinekweek in een aparte blister.
- Stop de safetybag én het ingevulde aanvraagformulier in de verzendenvelop.
- Controleer of het adres van het ziekenhuis zichtbaar is op de verzendenvelop en sluit de envelop.
- Stop de envelop in de brievenbus: dit kan alleen op dagen dat de brievenbus wordt gelegegd: maandag t/m donderdag vóór 17.00 uur.





Via afgifte van de kweken bij het ziekenhuis

- Gelre ziekenhuizen, locatie Apeldoorn: tijdens kantooruren kunt u de envelop afgeven bij het Medisch Microbiologisch laboratorium (route 189).
- Gelre ziekenhuizen, locatie Zutphen: tijdens kantooruren kunt u de envelop afgeven bij de balie van het bloedafname laboratorium (route 125).

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een deskundige infectiepreventie van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur via 055 – 581 8090.

