

Het gebruik van reuma-remmers en vaccinatie tegen COVID-19 (versie 10-01-21)

Inleiding

Vanaf januari 2021 gaat in Nederland gevaccineerd worden tegen COVID-19 (Corona). Het is begrijpelijk dat er vragen zijn over de veiligheid en werkzaamheid van dit vaccin bij het gebruik van reuma-remmers.

Reuma-remmers en vaccinatie tegen COVID-19

De reumatologen en verpleegkundigen Reumatologie van Gelre Ziekenhuizen volgen de richtlijnen en adviezen van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie. Het advies van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie luidt:

Voor patiënten met reumatische aandoeningen geldt zonder uitzondering: Laat je vaccineren. Dit is veilig.

Wanneer u een oproep krijgt voor de vaccinatie wordt door de [Rijksoverheid](#) bepaald.

Houd [de NVR website](#) en [RIVM](#) in de gaten voor nieuwe informatie.

In de week van 11 januari 2021 volgt er een uitgebreider advies van RIVM / NVR.

Achtergrond

In januari 2021 is in Nederland gestart worden met vaccinaties tegen COVID-19 met het vaccin van Pfizer- BioNTech (merknaam Comirnaty).

De gezondheidsraad stelt dat “dit vaccin goed werkt bij volwassenen, ouderen en medische risicogroepen en dat de voordelen opwegen tegen de nadelen”:

<https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/12/24/covid-19-vaccinatie-biontech-pfizer/>

Vaccinatie wordt alleen sterk afgeraden bij personen die een eerdere doorgemaakte anafylactische reactie (een ernstige overgevoeligheidsreactie) hebben gehad op een medicijn, voedingsmiddel of vaccinatie of bij een aangetoonde allergie voor een van de bestanddelen van het vaccin .

<https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0 DOMAIN,P0 LANG ,P3 RVG1:H,NL,127747> .