



Behandeling van aambeien op OK

Deze folder geeft u informatie over de behandeling van aambeien. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Ligging en functie van aambeien

Aambeien (haemorroïden) zijn uitgezakte zwellichamen / kussentjes nabij de anus. Een zwellichaam is een sponsachtig netwerk van bloedvaatjes, bedekt door slijmvlies binnen de sluitspier van de anus. Aambeien bevinden zich aan de binnenkant van de anus en wanneer de zwellichamen tegen elkaar aanliggen, sluiten ze de anus lekdicht af.

Oorzaak en klachten van aambeien

Wanneer er veel druk op de zwellichamen komt te staan kunnen ze uitrekken, daardoor uitzakken en zelfs naar buiten puilen. Dat kan aanleiding geven tot een ongemakkelijk of pijnlijk gevoel. Daarbij kan het bloed in de zwellichamen gestuwd raken, waardoor aambeien makkelijk bloeden. Ook kan er zich een bloedstolsel vormen in adertjes in de huid rond de anus. Dat is uitwendig voelbaar en pijnlijk. Dit noemt men een getromboseerd haemorroïd. Vooral een gebrek aan voedingsvezels in ons eten, waardoor de ontlasting te ingedikt en droog wordt, zorgt voor drukverhoging op de zwellichamen tijdens de stoelgang. Ook veel zitten, onvoldoende lichaamsbeweging en een te hoog lichaamsgewicht kunnen daartoe bijdragen.

Het voorkomen van klachten

Klachten kunnen worden voorkomen door de stoelgang zacht te houden en te reguleren, waardoor u minder hoeft te persen. Daarvoor is het eten van voldoende voedingsvezels (zemelen, bruinbrood, etc.) en voldoende drinken nodig (1½ - 2 liter per dag). Ook regulering van het toiletbezoek is van belang. Zo kort mogelijk op de wc zitten (minder dan 5 min) en niet persen. Daarnaast is het ook van belang er een zekere regelmaat in te brengen, zo voorkomt u dat u op ongelegen momenten de ontlasting te lang moet ophouden.


Zorg verder voor wat meer beweging en probeer zo nodig wat af te vallen.

De meeste patiënten met aambeienklachten hebben baat bij deze maatregelen en leefregels. Wanneer desondanks de klachten toch voortduren, is verdere behandeling nodig.



Diagnose en onderzoek

De klachten die aambeien kunnen geven, kunnen ook voorkomen bij andere afwijkingen van de endeldarm of de anus. Daarom wordt er onderzoek verricht van de anus, het anal kanaal en de endeldarm. De arts zal het onderzoek doen in een voor de patiënt comfortabele knie/elleboogsligging of linker zijligging. Het onderzoek gaat van de anus en de anus zelf en voert ook nog met de endeldarm naar de dikke darm. Het onderzoek kan bestaan uit een fysiek onderzoek van de anus en het aansluitende deel van de endeldarm met een speculair onderzoek, bijvoorbeeld een kijkonderzoek van de endeldarm met een endoscoop. Dit zal met name vaak worden voorgesteld bij patiënten met klachten die wijzen op andere afwijkingen van de endeldarm, omdat de kans dat andere afwijkingen de klachten veroorzaken is groter. Bij jongere patiënten is in het algemeen het onderzoek voldoende.



De behandeling

Poliklinische behandeling


Een logische behandeling is het terugbrengen van de zwellichamen op hun oorspronkelijk plaats. Het uitzakken is dan verholpen en de aambeien kunnen dan ook geen klachten meer geven. Het uitgezakte en dus overtollige slijmvlies kan met behulp van rubberbandjes worden afgebonden. Het overtollige slijmvlies sterft binnen zeven tot tien dagen af en verlaat tijdens de stoelgang met het rubber bandje het lichaam.

De behandeling gebeurt poliklinisch. U neemt plaats op een speciale onderzoekstafel, waarna er een klein buisje in de anus wordt gebracht. Daar doorheen wordt de behandeling uitgevoerd. Het duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Meestal is bij meer dan de helft van de patiënten al een goed resultaat te verwachten na de eerste poliklinische behandeling. Soms is een tweede of derde poliklinische behandeling nodig.

Behandeling tijdens een ziekenhuisopname

Wanneer de poliklinische behandeling niet helpt, is een operatie nodig. Of als sprake is van pijnlijke, volledig uitgezakte en/of ernstig afgeknelde aambeien. Er zijn een aantal technieken:

- Operatief verwijderen van het overtollige slijmvlies / de aambeien(en), met behulp van speciale diathermische apparatuur.
- Bij de behandeling met een circulair nietapparaat (een PPH-behandeling: procedure voor prolaps en aambeien) verwijdert de chirurg het aambeienweefsel en neemt de bloedvaten door (zie de afbeeldingen 1 en 2). Ook patiënten met een zogenaamd verzakkingsslijmvlies (prolaps) kunnen met een circulair nietapparaat worden behandeld.





Afbeelding 1: Het nietapparaat wordt via de anus ingebracht. Het slijmvlies wordt vastgepakt in het nietapparaat en dan afgevuurd.

Afbeelding 2: Het aambeienweefsel is verwijderd. De nietrij in de darm is na enige tijd vaak niet meer zichtbaar.

In verband met de pijn vinden deze operaties meestal plaats onder verdoving van de onderste lichaamshelft via een ruggenprik of onder algehele verdoving.

In het algemeen is het effect van de operatieve therapie beter en langduriger dan bij de poliklinische behandelingen. De operatieve behandelingen zijn echter ingrijpender qua pijn en mogelijk bloedverlies na de ingreep. Sommige patiënten moeten de eerste weken na de ingreep veel pijnstillers gebruiken.

Mogelijke complicaties

Geen enkele ingreep is zonder risico's. Zo is bij de chirurgische behandeling voor aambeien ook de normale kans op complicaties aanwezig die bij een operatie altijd bestaan.

- Een nabloeding kan nog wel eens optreden in dit bloedvatrijke gebied. Indien u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet u dit vóór de behandeling aan de arts melden. Deze medicijnen geven namelijk een verhoogd risico op nabloedingen. Daarom moet u hiermee tijdelijk stoppen in overleg met de arts.
- Wanneer een rubberbandje de endeldarm verlaat (het korstje gaat van de wond), kan er ook wat bloedverlies optreden. Lijkt het bloedverlies meer dan een kopje vol? Dan moet u contact opnemen met het ziekenhuis.
- Na een chirurgische behandeling voor aambeien kan er zich een blaasontledigingsstoornis voordoen. Kunt u echt niet meer plassen? Dan moet u contact opnemen met het ziekenhuis.
- Ten gevolge van een ontsteking op de behandlungsplaats kan er kortdurend een geringe temperatuurverhoging optreden.



Na de behandeling

Na de behandeling kan een onaangenaam en pijnlijk gevoel optreden. De ernst van de klachten hangt af van de grootte van het behandelde oppervlak. Tegen de pijn kunt u pijnstillers zoals paracetamol gebruiken. Deze zijn te koop bij apotheek en drogist. Indien de pijnstilling hiermee onvoldoende is, neemt u contact op met de polikliniek chirurgie. U krijgt ook nog een recept mee voor pijnstillers. Ook een warm zitbad kan de pijn verlichten.

Na de chirurgische behandeling in het ziekenhuis is het verstandig het anaal gebied goed schoon te houden, met name na de stoelgang, maar ook tussendoor. Twee keer per dag is meestal voldoende. Met de douche kunt u het gebied gemakkelijk schoon spoelen. Na een poliklinische behandeling kunt u meestal binnen één of twee dagen de werkzaamheden weer hervatten. Na een opname en behandeling onder narcose moet u rekening houden met een langer verzuim. Na de aambeienbehandeling moet u de stoelgang zacht houden. U krijgt daarvoor een recept voor medicijnen mee naar huis. Om te voorkomen dat opnieuw klachten optreden is het verstandig zo veel mogelijk bovengenoemde maatregelen en leefregels in acht te nemen.

Vragen?

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts of huisarts. Wanneer zich **thuis na de operatie** problemen voordoen, neem dan contact op met uw huisarts of met de polikliniek Chirurgie:

- maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur, tel: 0575 – 592 818
- www.gelreziekenhuizen.nl/chirurgiezutphen

De tekst van deze folder is gebaseerd op informatie van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde te Utrecht, 2005 en van Gelre ziekenhuizen.