

Betreft: Voorlopige uitslag brief na endoscopie

Apeldoorn/Zutphen, .....

Geachte mevrouw / heer,

Zojuist werd bij u een onderzoek verricht op de endoscopie afdeling. Wij vinden het belangrijk u middels deze brief te informeren over het verloop van het onderzoek.

**Het betrof een:**

gastroscopie     sigmoscopie     coloscopie     endo-echo     ERCP

**De bevindingen waren als volgt:**

- Geen afwijkingen
- Poliep(en), aantal..... verwijderd:     ja /  nee
- Er zijn bipten (hapjes) genomen voor verder onderzoek
- Overige bevindingen.....

**U bespreekt de uitslag van de endoscopie:**

- Dit is niet noodzakelijk.
- Met uw huisarts; hiervoor maakt u zelf een afspraak na ongeveer 10 dagen.
- Telefonische afspraak bij verpleegkundige .....Datum.....Tijd.....
- Telefonische afspraak bij dr. ....Datum.....Tijd.....
- Polikliniek afspraak bij dr. ....Datum: .....Tijd.....
- Er is eerst nog aanvullend onderzoek nodig.
- Het kan zijn dat de polikliniek Maag-Darm-Leverziekten deze afspraak nog voor u maakt. U krijgt dan de afspraak via e-mail of via de post toegestuurd.

**Medicijngebruik**

- U kunt uw diabetes medicijnen weer gebruiken volgens schema als u weer gaat eten.
- Gebruikt u bloedverdunners?
  - Dan kunt u vanaf ..... uw bloedverdunners weer gebruiken
  - U neemt de dag na het onderzoek zelf contact op met de trombosedienst als u daar onder behandeling bent.
- Niet van toepassing

**Dieetvoorschrift:**.....

Zoals u tevoren al werd verteld, kunnen er bij elke medische ingreep problemen ontstaan. Hoewel dit bij de endoscopie vrij zeldzaam is, vinden wij het toch verstandig u te wijzen op de klachten die u zou kunnen krijgen na de ingreep en wat u dan moet doen.

**Heeft u een roesje gekregen? Dan mag u de eerste 24 uur zeker niet:**

- Actief deelnemen aan het verkeer
- Alcohol drinken
- Belangrijke beslissingen nemen
- Gevaarlijke machines bedienen

**Vaker voorkomende klachten thuis, u hoeft geen contact op te nemen:**

- Na een onderzoek van de maag kan uw keel wat geïrriteerd aanvoelen; gorgel dan met wat lauwwarm zout water of gebruik keelpastilles.
- Buikkrampen die afnemen
- Een opgeblazen gevoel
- Na een onderzoek van de darmen een klein beetje bloedverlies uit de anus zonder stolsels, waarbij een vol kopje het maximum is.

**Klachten in de thuissituatie waarbij u direct contact moet opnemen:**

Colo- of sigmoïdoscopie	Gastroscopie of Endo-echo
<ul style="list-style-type: none"><li>• Bij heftige, <u>in ernst toenemende pijn</u></li><li>• Koorts &gt;38,5° C</li><li>• Bloedverlies uit de anus met stolsels</li><li>• Bloedverlies met (neiging tot ) flauwvallen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bij heftige, <u>in ernst toenemende pijn</u></li><li>• Koorts &gt;38,5° C</li><li>• Bloed opgeven en/of stolsels</li><li>• Blijvende slikklachten</li></ul>

Neem dan direct contact op met de Endoscopie afdeling, wacht niet tot de volgende ochtend! Meestal wordt u gevraagd naar het ziekenhuis te komen voor beoordeling.

**Heeft u nog vragen?**

Neem dan contact op met het afdelingssecretariaat Endoscopie:

Maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur  
Tel: 088 – 105 3355

Buiten deze tijden:  
Spoedeisende hulp  
Tel: 088 -105 3300

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,  
Vakgroep Maag- Darm- en Leverartsen en medewerkers afdeling Endoscopie, Gelre ziekenhuizen