

Vragen (géén beoordeling), worden plenair doorgenomen aan het eind van de studiedag

1. Een schedeltrauma

- a) geeft vrijwel nooit tot duizeligheidsklachten
- b) leidt vaak tot BPPD
- c) geeft duizeligheidsklachten door schade aan de cervicale wervelkolom
- d) moet ernstig zijn, wil het duizeligheidsklachten geven

2. Vestibulaire nystagmus

- a) is altijd horizontaal of verticaal
- b) verdwijnt volledig bij visuele fixatie
- c) kan rotatoir zijn
- d) wordt gezien bij alle aandoeningen van het evenwichtsorgaan

3. De bril van Frenzel

- a) wordt gedragen door de arts
- b) maakt beoordeling van de retina mogelijk
- c) onderdrukt de vestibulaire nystagmus
- d) onderdrukt visuele fixatie

4. Met oscillopsie wordt bedoeld

- a) schommelend beeld van de omgeving beeld zodra het hoofd wordt bewogen
- b) spontane aanvallen van draaiduizeligheid
- c) gevoel alsof het hoofd beweegt terwijl het hoofd niet beweegt
- d) a, b en c

5. Oscillopsie wordt gezien bij

- a) de Dix-Hallpikemanoeuvre
- b) tijdens een duizeligheidsaanval
- c) allerlei vestibulaire aandoeningen
- d) vestibulaire uitval

6. De head impulse test wordt gebruikt om een afwijking vast te stellen in

- a) oogvolgbeweging
- b) vestibulo-oculaire reflex
- c) vestibulo-spinale reflex
- d) vestibulo-collische reflex

7. Wat is onjuist betreffende de Dix-Hallpikemanoeuvre?

- a) wordt gebruikt om BPPD aan te tonen
- b) kan worden uitgevoerd bij patiënten met een beperkte nekmobiliteit
- c) wordt ook wel supine roll test genoemd
- d) is goed uitvoerbaar in de spreek-/behandelkamer

8. Hoe kan BPPD van het posterieure kanaal het beste worden behandeld?

- a) door af te wachten (gaat vanzelf over)
- b) met een Epleymanoeuvre
- c) met Brandt-Daroff oefeningen
- d) met Cawthorne-Cooksey oefeningen

9. Wanneer is verwijzing naar een specialist niet geïndiceerd?

- a) als behandeling van een BPPD met een (herhaalde) Epleymanoeuvre niet werkt
- b) als bij de Dix-Hallpikemanoeuvre een downbeat nystagmus optreedt
- c) als bij de Dix-Hallpikemanoeuvre een rotatoire nystagmus optreedt
- d) als bij de Dix-Hallpikemanoeuvre heftige nystagmus zonder duizeligheid optreedt

10. Uitgangspunten bij vestibulaire revalidatie zijn

- a) vroeg beginnen
- b) geen vestibulosuppressieve medicatie
- c) 'no pain, no gain approach'
- d) alle bovengenoemde