



Injectie op de röntgen


Na uw bezoek aan de orthopedisch chirurg werd u doorverwezen voor een diagnostische injectie op de röntgenafdeling. In deze folder leest u meer over deze injectie.

Röntgen

Met behulp van het röntgenapparaat wordt er een injectie in uw heup- dan wel AC-gewricht gegeven. Door het röntgenapparaat te gebruiken kan er heel gecontroleerd worden geprikt. De injectie bevat een verdoving (lidocaine) en een ontstekingsremmer (corticosteroid / kenacort).


Heupgewricht

Een injectie in het heupgewricht wordt vaak gegeven bij een verdenking op slijtage van de heup. Mocht het effect van deze injectie erg goed zijn, dus klachten verminderend, dan weet uw orthopedisch chirurg dat uw klachten vanuit de heup komen en niet bijvoorbeeld uit uw rug. Hiermee kan uw orthopedisch chirurg de diagnose arthrose van de heup bevestigen en eventueel, in overleg met u, besluiten tot het plaatsen van een totale heupprothese.



AC-gewricht

Het AC-gewricht is een klein gewrichtje tussen het sleutelbeen en schouderblad bovenop de schouder. Een injectie in het AC-gewricht wordt vaak gegeven bij AC-pijn, mogelijk ontstaan door een val of door arthrose van het AC gewricht. Mocht het effect van deze injectie erg goed zijn, dus klachten verminderend, dan weet uw orthopedisch chirurg dat uw klachten vanuit het AC-gewricht komen. Hiermee kan uw orthopedisch chirurg de diagnose AC-pijn bevestigen en eventueel, in overleg met u, besluiten tot een operatieve ingreep.



Effect injectie

Na de injectie heeft u meestal binnen een aantal uren minder pijn, dit als gevolg van de werking van het snelwerkende verdovingsmiddel. Het verdovingsmiddel werkt binnen 3 uur uit. Kenacort heeft meestal pas na 2-4 dagen een merkbaar effect, soms pas na 1 of 2 weken. Hoe lang u baat zult hebben bij een injectie is vooraf moeilijk te zeggen. Wij adviseren u om iemand mee te nemen voor het vervoer naar huis na de injectie.



Bijwerkingen

Er zijn een aantal bijwerkingen die kunnen ontstaan na het krijgen van een injectie met een corticosteroid.

Regelmatig:

Pijn op de plek van de injectie, hiervoor kunt u paracetamol gebruiken (3 dd 2 tabletten van 500 mg).

Soms

De bloedsuikerspiegel kan enkele dagen stijgen bij patiënten met suikerziekte, hetgeen extra controle van uw glucose vraagt.

Flushing; dit betekent hevig blozen, roodheid en warmte in het gelaat.

Kortdurende stijging van de bloeddruk.

Zelden

Hartkloppingen, deze zijn onschuldig en voorbijgaand van aard.

Plaatselijke huidveranderingen (verkleuring van de huid, dunner worden van de huid).

Infectie.

Physician Assistant

De injectie wordt gedaan door de physician assistant orthopedie of uw orthopedisch chirurg zelf. De physician assistant is door de orthopedisch chirurgen opgeleid om deze injectie zelfstandig uit te voeren.

Poliklinische controle

Twee tot zes weken na de injectie volgt een controle afspraak met uw orthopedisch chirurg waar u uw bevindingen na de injectie kan bespreken. Het is belangrijk dat u goed het effect van de injectie kunt beschrijven. Zo nodig kunt u een dagboekje bijhouden waarin u de pijn een cijfer geeft (0 = geen pijn, 10 = hele erge pijn).

Wanneer contact opnemen

Bij koorts, zwelling, roodheid en/of hevige pijn die niet overgaat of niet voldoende reageert op koeling en pijnstilling. Mogelijk is er een infectie ontstaan op de plaats van de injectie. Dit is een reden om direct contact met ons op te nemen, ook 's avonds of in het weekend.

Polikliniek Orthopedie Gelre Zutphen
maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur
tel: 0575 – 592 820